herpy

GECKOS

Reticulate banded gecko

Coleonyx reticulatus

Coleonyx reticulatus ist ein seltener, hell gelbbrauner und dicht gefleckter Wüstengecko mit netzartiger Zeichnung, der nur im Gebiet des Big Bend im Westen von Texas und in den angrenzenden Teilen von Coahuila in Mexiko lebt. Er ist nachtaktiv und hat bewegliche Augenlider. Die Art wird kaum in menschlicher Obhut gehalten, und es gibt nur wenig Wissen über die Pflege.

Familie: Eublepharidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**14-17 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Wüste, Halbwüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**75 × 40 × 30 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-29 °C**
Sonnenplatz	**32-34 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-40 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**40-60 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Coleonyx reticulatus* gibt es nur wenig Wissen.
TEMPERATUR	Die Art braucht einen Temperaturgradienten. Es soll eine warme Zone von 32-34 °C an einem Versteck geben, während der Rest des Terrariums bei 22-29 °C gehalten wird. Nachts darf die Temperatur auf 18-22 °C fallen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art stammt aus einem trockenen Klima, und die normale Luftfeuchtigkeit im Terrarium wird bei 30-40 % gehalten.
LICHT UND UVB	*Coleonyx reticulatus* ist nachtaktiv und braucht kein starkes Licht.
FÜTTERUNG	*Coleonyx reticulatus* frisst lebende Gliederfüßer, und wie alle Geckos der Gattung nimmt er das meiste, was er überwältigen kann. Die besten Futtertiere sind Mehlwürmer, Heimchen und Schaben (z. B.
VERHALTEN UND UMGANG	Männchen sind untereinander unverträglich, und Weibchen können einander stressen, daher wird *Coleonyx reticulatus* am besten einzeln oder als ein Männchen und ein Weibchen gehalten. Halte niemals zwei Männchen zusammen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten und Mexiko.