herpy

GECKOS

South-western clawless gecko

Crenadactylus ocellatus

Einer der allerkleinsten Geckos Australiens: höchstens 4 cm von der Schnauze bis zur Kloake und völlig ohne Krallen an den Zehen. *Crenadactylus ocellatus* lebt versteckt unter Rinde, herabgefallenem Holz und Steinen im Südwesten Australiens. Über die Pflege ist nur wenig bekannt, und die Art ist in Terrarien außerhalb Australiens fast unbekannt.

Familie: Diplodactylidae Früherer Name: *Diplodactylus ocellatus; Diplodactylus bilineatus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-4 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 20 × 20 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Sonnenplatz	**28-30 °C**
Temperatur, Nacht	**14-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**55-75 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Crenadactylus ocellatus* ist nur wenig bekannt, und die Art wird außerhalb Australiens fast nicht gehalten.
TEMPERATUR	Tagsüber sollen im Terrarium 22-26 °C herrschen, und ein kleiner Bereich an einem Ende darf gern 28-30 °C erreichen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll niedrig bis mittel sein: 30-50 %.
LICHT UND UVB	Die Art ist nachtaktiv und lebt tagsüber versteckt, daher ist UVB nicht nötig.
FÜTTERUNG	Die Nahrung in der Natur ist nicht dokumentiert. Zur Größe passen kleine Gliedertiere: Springschwänze, Fruchtfliegen, kleine Termiten, frisch geschlüpfte Grillen und kleine Schaben.
VERHALTEN UND UMGANG	*Crenadactylus ocellatus* ist schnell, scheu und schwer zu sehen, weil sie sich tagsüber versteckt und im Dunkeln aktiv ist.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.