herpy

GECKOS

Bauer's chameleon gecko

Eurydactylodes agricolae

Eurydactylodes agricolae ist ein kleiner, schlanker Kletterer aus den Wäldern im Nordwesten Neukaledoniens mit oliv- bis moosgrüner, körniger Schuppenhaut und gelben Abzeichen am Maul und an den Gliedmaßen. Er verträgt Wärme schlecht, ist aber in einem kühlen, feuchten und dicht bepflanzten Terrarium nicht schwer zu halten.

Familie: Diplodactylidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**5-6 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber und in der Dämmerung**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**18-24 °C**
Temperatur, Nacht	**16-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-90 %**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und Fertigfutter**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**18-36 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Gelege pro Jahr	**5-7**
Inkubation	**60-120 Tage** bei 22-25 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein erwachsenes Exemplar von *Eurydactylodes agricolae* oder ein Paar kann in einem Terrarium von mindestens 30 × 30 × 45 cm (Länge × Breite × Höhe) gehalten werden, und höher ist immer besser.

TEMPERATUR

Eurydactylodes agricolae stammt aus Wäldern mit gemäßigter Temperatur und verträgt Wärme schlecht. Halte tagsüber 18-24 °C, und die Tiere kommen bei gewöhnlicher Zimmertemperatur gut zurecht.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit bei *Eurydactylodes agricolae* soll mäßig bis hoch sein und im Laufe des Tages schwanken. Strebe tagsüber 60-70 % und nach dem Besprühen am Abend 80-90 % an.

LICHT UND UVB

Eurydactylodes agricolae ist tagsüber und in der Dämmerung aktiv und sonnt sich gern unter dem UVB-Licht. Sorge für einen festen Tagesrhythmus mit 10-14 Stunden Licht. UVB ist nicht unbedingt nötig.

FÜTTERUNG

Das Grundfutter für *Eurydactylodes agricolae* ist ein fertig gemischtes Pulverfutter für fruchtfressende neukaledonische Geckos, das zu einem geschmeidigen Brei angerührt wird.

VERHALTEN UND UMGANG

Eurydactylodes agricolae ist klein, schnell und zerbrechlich und vor allem ein Tier zum Anschauen. Mit Geduld kann er sich an kurzes, ruhiges Anfassen gewöhnen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Neukaledonien.