herpy

GECKOS

Western chameleon gecko

Eurydactylodes occidentalis

Eurydactylodes occidentalis ist die kleinste Art der Gattung der neukaledonischen Chamäleongeckos: ein kleiner, nachtaktiver Baumgecko mit Greifschwanz, der nur im Küstentiefland an der Westseite von Grande Terre vorkommt. Die Art wurde erst 2009 beschrieben, ist in der Natur bedroht und wird nur selten in Menschenhand gehalten. Die Haltung stützt sich auf die Verwandten *Eurydactylodes vieillardi* und *Eurydactylodes agricolae*.

Familie: Diplodactylidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**5 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Sonnenplatz	**27-29 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten, Obst und Fertigfutter**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**50-90 Tage** bei 22-26 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Eurydactylodes occidentalis* ist nur wenig bekannt. Die Zahlen sind von *Eurydactylodes vieillardi* und *Eurydactylodes agricolae* übernommen, die fast dieselbe Lebensweise und Größe haben.
TEMPERATUR	Tagsüber sollen im größten Teil des Terrariums 22-26 °C herrschen, mit einem warmen Platz unter einer Lampe von 27-29 °C. Nachts soll die Temperatur auf 20-23 °C sinken.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Halte die Luftfeuchtigkeit bei 60-80 %, gemessen in der Mitte des Terrariums. Sie ist am niedrigsten am warmen Ende und am höchsten am kühlen. Sie soll nachts steigen und im Lauf des Tages sinken, aber nie unter 50 % fallen.
LICHT UND UVB	Die Art ist nachtaktiv und kommt ohne UVB aus, wenn das Futter Vitamin D3 enthält, aber ein schwaches UVB-Licht ist von Vorteil. Verwende eine UVB-Röhre für Schattentiere (Ferguson-Zone 1), z.
FÜTTERUNG	Die Art ist vermutlich wie der Rest der Gattung ein Frucht- und Insektenfresser. Gib etwa zur Hälfte Fertigfutter für fruchtfressende Geckos, zu einem dicken Brei angerührt, und zur Hälfte lebende Insekten.
VERHALTEN UND UMGANG	*Eurydactylodes occidentalis* ist klein und ruhig, und die Arten der Gattung lassen sich an kurzes Anfassen gewöhnen. Gönne einem neuen Tier zwei Wochen Ruhe und nimm es nur in die Hand, wenn es gefressen hat.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Neukaledonien.