herpy

GECKOS

Bavay's gecko

Eurydactylodes vieillardi

Eurydactylodes vieillardi ist ein kleiner, ruhiger und nachtaktiver Gecko aus den Wäldern der Hauptinsel Neukaledoniens, mit großen, unregelmäßigen Schuppen, die wie Öltropfen auf Wasser aussehen, und einem Greifschwanz. Er kann eine übel riechende Flüssigkeit aus dem Schwanz verspritzen, wenn er erschrickt.

Familie: Diplodactylidae Früherer Name: *Platydactylus vieillardi; Eurydactylus vieillardi*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**10-13 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**4-12 g**
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Sonnenplatz	**27-29 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten, Obst und Fertigfutter**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**50-90 Tage** bei 22-26 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Für ein erwachsenes Tier muss das Terrarium mindestens 45 × 45 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe) groß sein. Größer ist immer besser, und die Höhe ist wichtiger als die Grundfläche, weil die Art klettert.

TEMPERATUR

Eurydactylodes vieillardi ist nachtaktiv und fühlt sich bei gemäßigten Temperaturen am wohlsten. Tagsüber sollten es im größten Teil des Terrariums 22-26 °C sein und unter einer Lampe ein warmer Platz mit 27-29 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Art gedeiht am besten bei hoher Luftfeuchtigkeit, und ein Durchschnitt von 60-80 % ist das Ziel, gemessen in der Mitte des Terrariums. Es ist normal, dass die Feuchtigkeit am warmen Ende niedriger und am kalten Ende höher ist.

LICHT UND UVB

Die Art ist nachtaktiv, sucht aber in den Tagesstunden die Äste auf und sonnt sich. Sie kommt ohne UVB aus, wenn sie über das Futter Vitamin D3 bekommt, gedeiht aber besser mit schwachem UVB-Licht, das auch die Farben hervorhebt.

FÜTTERUNG

Die Art frisst sowohl Insekten als auch Obst.

VERHALTEN UND UMGANG

Eurydactylodes vieillardi ist ein kleiner, robuster und verhältnismäßig langsamer Gecko, der recht zahm werden kann. Ein neues Tier sollte zwei Wochen Ruhe haben, bevor man es anfasst, und nur, wenn es gefressen hat.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Neukaledonien.