herpy

GECKOS

Wiegmann's striped gecko

Gonatodes vittatus

Ein kleiner, tagaktiver Gecko aus Venezuela, Kolumbien und von den vorgelagerten Inseln, dessen Männchen einen weißen Streifen mit schwarzem Rand auf dem Rücken und einen gelben Kopf trägt. Er klettert an Baumstämmen und Mauern, kann aber nicht an Glas hochlaufen, und er kommt in einem kleinen Terrarium gut zurecht, wenn er einzeln oder als Paar gehalten wird.

Familie: Sphaerodactylidae Früherer Name: *Gymnodactylus vittatus; Gonatodes gillii*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-8 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-27 °C**
Sonnenplatz	**29-32 °C**
Temperatur, Nacht	**20-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-60 %**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1 Eier**
Inkubation	**65-110 Tage** bei 25-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar braucht ein Terrarium von mindestens 30 × 30 × 30 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser, weil mehr Platz mehr Ruhe bedeutet.
TEMPERATUR	Tagsüber sollen im Terrarium 24-27 °C herrschen. Ein warmer Platz von 29-32 °C kann mit einer Heizmatte oder einer Lampe geschaffen werden, ist aber nicht nötig, wenn die Temperatur sonst hoch und stabil ist.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	*Gonatodes vittatus* gedeiht in trockenerer Luft als die meisten tropischen Geckos. Halte die Luftfeuchtigkeit bei 50-60 %.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv, sonnt sich aber nicht, und UVB ist optional. Schwaches UV-Licht kann es erleichtern, die Tiere zur Zucht zu bringen, aber zu viel UV kann Probleme bei der Häutung verursachen.
FÜTTERUNG	*Gonatodes vittatus* frisst Insekten und andere kleine Gliederfüßer.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist kühn und neugierig und ist oft tagsüber zu sehen, aber sie ist kein Tier, das man in die Hand nehmen sollte. Die Haut kann reißen, wenn das Tier gepackt wird, und die Tiere werden leicht gestresst.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kolumbien, Venezuela, Guyana, Trinidad und Tobago, Aruba und Curaçao.