herpy

GECKOS

Asiatischer Hausgecko

Hemidactylus frenatus

Hemidactylus frenatus ist ein robuster, nachtaktiver Gecko aus Süd- und Südostasien, der mit Schiffen und Fracht in alle Tropen gelangt ist und heute in den Häusern weiter Teile der Welt lebt. Er klettert an senkrechten Flächen, jagt Insekten unter Lampen und ruft mit einem hohen, tickenden Glucksen. In Terrarien ist er selten, und am bekanntesten ist er als invasive Art.

Familie: Gekkonidae Englisch: Common house gecko Früherer Name: *Hemidactylus vittatus; Hemidactylus okinawensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**8-15 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und felsbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**30-32 °C**
Temperatur, Nacht	**22-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-70 %**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**6-12 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**46-62 Tage** bei 28-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht beurteilt (NE)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein einzelnes erwachsenes *Hemidactylus frenatus* braucht ein Terrarium von mindestens 40 × 30 × 40 cm (Länge × Breite × Höhe). Ein Paar braucht mindestens 60 × 40 × 40 cm mit vielen Verstecken.

TEMPERATUR

Halte im Terrarium tagsüber 25-30 °C und nachts 22-25 °C. Richte einen warmen Bereich von 30-32 °C ein, z. B. mit einer kleinen Wärmelampe an einem Ende, und lass das gegenüberliegende Ende kühl, damit das Tier wählen kann.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Halte eine Luftfeuchtigkeit von etwa 50-70 % und besprühe das Terrarium einmal täglich leicht, am besten abends, sodass Tau auf Blättern und Steinen liegt. Die Feuchtigkeit muss im Laufe des Tages sinken können.

LICHT UND UVB

Hemidactylus frenatus ist in der Dämmerung und nachts aktiv, und es gibt keine dokumentierte UVB-Empfehlung.

FÜTTERUNG

In der Natur ist *Hemidactylus frenatus* ein vielseitiger Jäger. Insekten und Spinnen machen den größten Teil der Nahrung aus: Schaben, Termiten, Fliegen, Motten, Käfer, Bienen und Wespen.

VERHALTEN UND UMGANG

Hemidactylus frenatus ist schnell, nervös und sollte nicht angefasst werden. Er kann beißen, wenn er gestresst ist, aber der Biss ist recht schwach und für Menschen harmlos.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Indien, Sri Lanka, Bangladesch, Myanmar, Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapur, Indonesien und Philippinen.