herpy

GECKOS

Banded velvet gecko

Homopholis fasciata

Ein kräftiger, samtweicher Gecko aus den Savannen Ostafrikas mit dunklen Bändern über dem Rücken und sowohl Haftlamellen als auch Krallen an den Zehen. Er ist vor allem nachts aktiv, versteckt sich in Löchern großer Bäume und stellt sich tot, wenn er bedroht wird. Die Haltung ist nur in groben Zügen beschrieben.

Familie: Gekkonidae Früherer Name: *Platypholis fasciata; Homopholis erlangeri*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**9-11 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**8-12 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-28 °C**
Sonnenplatz	**28-32 °C**
Temperatur, Nacht	**19-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
UVB	**Optional**
Winterruhe	**19-23 °C** 12-16 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**2 Eier**
Gelege pro Jahr	**4-5**
Inkubation	**60-80 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Homopholis fasciata klettert, daher braucht ein Paar ein hohes Terrarium von mindestens 40 × 40 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe). Größer ist immer besser, besonders wenn du mehr als zwei Tiere hältst.

TEMPERATUR

Tagsüber soll die Temperatur bei 24-28 °C liegen, und es soll einen wärmeren Platz von 28-32 °C geben, z. B. unter einer kleinen Halogenlampe von 10-20 W oder über einer Heizmatte.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll mäßig bis hoch sein, 60-80 %, mit einem Gefälle von einem Ende des Terrariums zum anderen.

LICHT UND UVB

Die Art ist in der Dämmerung und nachts aktiv und kann bei Tageslicht gesehen werden, versteckt sich aber mittags im Schatten. Verwende normales Pflanzenlicht an einer Zeitschaltuhr, 12 Stunden an und 12 Stunden aus.

FÜTTERUNG

Das Hauptfutter sind Heimchen, ergänzt durch Schaben, Mehlwürmer und andere Insekten in passender Größe, damit das Futter abwechslungsreich ist. Wachsmottenlarven können ab und zu gegeben werden.

VERHALTEN UND UMGANG

Homopholis fasciata kann beißen und sich festhalten, und sie stellt sich tot und bleibt oft reglos liegen, wenn sie Angst hat, nimm sie daher nicht ohne Grund hoch. Gib neuen Tieren Zeit, sich einzugewöhnen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Äthiopien, Kenia, Somalia und Tansania.