herpy

GECKOS

Okavango dwarf gecko

Lygodactylus chobiensis

Einer der größten Zwergtaggeckos der Gattung, bis zu 44 mm von der Schnauze bis zur Kloake. *Lygodactylus chobiensis* ist blaugrau mit großen hellen Flecken und gelbem Bauch, lebt auf Bäumen in der Savanne entlang des Chobe und des Sambesi und kann in einem kleinen, hohen und dicht bepflanzten Terrarium gehalten werden.

Familie: Gekkonidae Früherer Name: *Lygodactylus picturatus chobiensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-4 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**30-35 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**40-65 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**9 Monate**
Gelegegröße	**2 Eier**
Inkubation	**125 Tage** bei 24-27 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Lygodactylus chobiensis* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	*Lygodactylus chobiensis* ist ein wärmeliebendes Tagtier, und das Terrarium muss einen deutlichen Temperaturunterschied haben.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll bei etwa 40-65 % liegen, etwas niedriger als bei *Lygodactylus picturatus*, weil der Lebensraum eine lange Trockenzeit hat. Die Angabe ist eine Schätzung.
LICHT UND UVB	*Lygodactylus chobiensis* ist tagaktiv und braucht kräftiges, gleichmäßiges Licht. Verwende Leuchtstoffröhren, am besten T5, und kombiniere eine UVB-Röhre mit einer Tageslichtröhre, damit das Terrarium hell wird.
FÜTTERUNG	In der Natur ernährt sich *Lygodactylus chobiensis* hauptsächlich von Ameisen und Termiten.
VERHALTEN UND UMGANG	*Lygodactylus chobiensis* ist klein und schnell. Wie andere tagaktive Zwergtaggeckos sitzt sie oft regungslos auf einem Ast und schießt dann hinter einem Futtertier her.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Namibia, Botsuana, Sambia, Simbabwe, Mosambik und Malawi.