herpy

GECKOS

Rüppell's semaphore gecko

Pristurus flavipunctatus

Ein kleiner, tagaktiver Gecko aus den Ländern rund um den südlichen Teil des Roten Meeres, mit hohem, sägezahnartig gekieltem Schwanz und gelben Flecken. Er wird einschließlich Schwanz etwa 8 cm lang, und über die Haltung ist fast nichts bekannt.

Familie: Sphaerodactylidae Früherer Name: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-8 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**28-30 °C**
Sonnenplatz	**40-45 °C**
Temperatur, Nacht	**20-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-40 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1 Eier**
Inkubation	**70-90 Tage** bei 28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Pristurus flavipunctatus* ist fast nichts bekannt. Die Pflege beruht auf dem Klima im Verbreitungsgebiet und auf *Pristurus carteri*, der in Terrarien am besten bekannten Art der Gattung.
TEMPERATUR	Lege ein Gefälle mit 28-30 °C am kühlen Ende und einem Sonnenplatz von 40-45 °C unter einem Spotstrahler an. Nachts darf die Temperatur auf 20-22 °C fallen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luft muss trocken sein, etwa 30-40 %.
LICHT UND UVB	*P. flavipunctatus* ist tagaktiv und braucht kräftiges Tageslicht und UVB über dem Sonnenplatz, z. B. eine T5-Röhre. Ferguson-Zone 3 ist eine Schätzung für einen tagaktiven Wüstengecko.
FÜTTERUNG	Die Art frisst kleine Gliedertiere. Biete Springschwänze, Taufliegen, kleine Grillen und andere kleine Insekten an, nicht breiter als der Kopf des Tieres.
VERHALTEN UND UMGANG	*Pristurus flavipunctatus* ist schnell und wachsam, eignet sich nicht zum Handling, und der Schwanz kann abbrechen. Das Verhalten der Tiere untereinander in Menschenobhut ist nicht dokumentiert.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Eritrea, Äthiopien, Dschibuti, Somalia, Sudan, Südsudan, Ägypten und Saudi-Arabien.