herpy

GECKOS

Sinai fan-fingered gecko

Ptyodactylus guttatus

Ein schlanker Felsgecko mit fächerförmigen Zehen und einem Muster aus dunklen und hellen Flecken auf dem Rücken. Er lebt an Felsen und Steinmauern auf dem Sinai, im Negev und in den Nachbarländern. Über die Haltung ist nur wenig bekannt, daher sind viele Werte von der Gattung übernommen.

Familie: Phyllodactylidae Früherer Name: *Ptyodactylus gecko; Gecko maculatus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6-9 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-11 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend**
Lebensraum	**Wüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**27-32 °C**
Sonnenplatz	**32-38 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
UVB	**Optional**
Winterruhe	**10-21 °C** 8-12 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**12 Monate**
Gelegegröße	**2 Eier**
Gelege pro Jahr	**5-6**
Inkubation	**45-100 Tage** bei 27-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Ptyodactylus guttatus* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	Das Terrarium braucht ein deutliches Temperaturgefälle. Tagsüber sollten es 27-32 °C sein, und unter dem Wärmestrahler muss ein Platz 32-38 °C erreichen. Nachts sinkt die Temperatur auf 18-22 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	*Ptyodactylus guttatus* stammt aus trockenen Gegenden und gedeiht bei niedriger bis mäßiger Luftfeuchtigkeit von 30-50 %. Der Wert ist eine Schätzung. Das Terrarium soll nicht nass sein, und der Bodengrund muss abtrocknen können.
LICHT UND UVB	Verwende einen Wärmestrahler oder Spot über einem flachen Stein, damit das Tier sich sonnen kann. Der UVB-Bedarf ist für die Art nicht dokumentiert.
FÜTTERUNG	*Ptyodactylus guttatus* ernährt sich von Insekten und anderen kleinen Gliedertieren. Heimchen, Heuschrecken, Mehlwürmer und Schaben sind gute Futtertiere, und sie müssen kleiner sein als der Abstand zwischen den Augen des Tieres.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ptyodactylus guttatus* ist schnell und scheu und eignet sich nicht zum Handling. Gib ihr nach einem Umzug Ruhe, um sich einzugewöhnen. Fasse nie den Schwanz an, denn er kann abgeworfen werden.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Ägypten, Israel, Palästinensische Autonomiegebiete, Syrien, Jordanien und Saudi-Arabien.