herpy

GECKOS

Lesser rough-snouted gecko

Rhacodactylus trachycephalus

Rhacodactylus trachycephalus ist ein seltener, nachtaktiver Kletterer von der Île des Pins und der kleinen Insel Môrô in Neukaledonien und bringt lebende Junge zur Welt. Die Art ist in der Natur vom Aussterben bedroht und in Menschenobhut selten. Die Haltung ähnelt den übrigen *Rhacodactylus*-Arten, aber die Tiere sind teuer, wachsen langsam und bekommen höchstens zwei Junge pro Jahr.

Familie: Diplodactylidae Früherer Name: *Chameleonurus trachycephalus; Rhacodactylus trachyrhynchus trachycephalus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**10-14 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**65-70 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten und Fertigfutter**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**36-60 Monate**
Wurfgröße	**1-2 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**180 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Vom Aussterben bedroht (CR)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Die Art gedeiht am besten in einem hohen Terrarium von mindestens 45 × 45 × 90 cm (Länge × Breite × Höhe). Es bietet Platz für ein bis vier Tiere, und ein größeres Terrarium ist immer ein Vorteil.

TEMPERATUR
Tagsüber braucht *Rhacodactylus trachycephalus* 22-26 °C, und nachts darf die Temperatur auf 18-21 °C fallen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Luftfeuchtigkeit sollte bei etwa 65-70 % liegen. Sie lässt sich mit einer lebenden Pflanze, feuchtem Sphagnum in einem Versteck und regelmäßigem Sprühen halten.

LICHT UND UVB
Die Art ist völlig nachtaktiv und kommt erst hervor, wenn es dunkel ist. Es ist nicht nachgewiesen, dass UVB notwendig ist, aber alle *Rhacodactylus*-Arten sonnen sich vermutlich in der Natur etwas.

FÜTTERUNG
Das Futter besteht aus lebenden Insekten und einem trockenen Pollen- und Nektarfutter für Taggeckos, das ständig bereitsteht. Gib vier erwachsene Heimchen pro erwachsenem Tier einmal pro Woche.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Art ist ruhig, und bei regelmäßigem Handling werden die Tiere zahm und genauso leicht aufzunehmen wie *Correlophus ciliatus*. Die Tiere sind nachts aktiv, handhabe sie daher abends.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Neukaledonien.