herpy

GECKOS

Rough-throated leaf-tailed gecko

Saltuarius salebrosus

Saltuarius salebrosus ist ein großer, nachtaktiver Blattschwanzgecko aus dem mittleren Osten und Süden von Queensland in Australien. Er hat eine raue, mit Knötchen besetzte Kehle, eine Haut, die flechtenbewachsener Rinde gleicht, und einen breiten, blattförmigen Schwanz. Er verträgt mehr Wärme als die anderen Arten der Gattung, kommt im Terrarium gut zurecht und ist eine ruhige Art für den erfahrenen Halter.

Familie: Carphodactylidae Früherer Name: *Phyllurus salebrosus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**14 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und felsbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 80 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**19-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**55-100 %**
UVB	**Nicht nötig**
Winterruhe	**10-16 °C** 9-13 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**36-48 Monate**
Gelegegröße	**2 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-3**
Inkubation	**95-105 Tage** bei 26-28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Zwei oder drei Tiere können in einem Terrarium von 60 × 40 × 80 cm (Länge × Breite × Höhe) gehalten werden.

TEMPERATUR

Die Tagestemperatur beträgt 22-26 °C und die Nachttemperatur 19-21 °C. Die Werte für Temperatur, Feuchtigkeit, Ruhezeit und Brut sind vom verwandten *Phyllurus platurus* übernommen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Besprühe das Terrarium gründlich 2-3 Mal pro Woche. Die Luftfeuchtigkeit steigt nach dem Besprühen gegen 100 % und soll dann auf etwa 55-60 % fallen, damit Rinde und Bodengrund abtrocknen können.

LICHT UND UVB

Die Art ist nachtaktiv und lebt tagsüber versteckt, und UVB ist nicht notwendig. Gib dem Terrarium einen festen Tag-Nacht-Rhythmus mit schwachem Tageslicht und Dunkelheit in der Nacht.

FÜTTERUNG

Die Art nimmt gewöhnliche Futterinsekten wie Heimchen und Schaben. In der Zuchtsaison wird dreimal pro Woche gefüttert, den Rest des Jahres alle zwei Wochen. In der Ruhezeit selbst werden die Tiere nicht gefüttert (siehe Zucht).

VERHALTEN UND UMGANG

Saltuarius salebrosus ist eine ruhige und nachtaktive Art, die tagsüber still auf Rinde sitzt. Sie stellt wenige Ansprüche, soll aber nicht mehr als unbedingt nötig angefasst werden, und niemals am Schwanz, den sie abwirft.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Australien.