herpy

GECKOS

Ocellated gecko

Sphaerodactylus argus

Ein kleiner, tagaktiver Zwerggecko aus Jamaika und von den Inseln San Andrés und Providencia, mit Schwanz nur gut 6 cm lang. *Sphaerodactylus argus* ist bräunlich mit gelben Punkten und Strichen auf dem Kopf, lebt in trockenem Wald und Laubstreu und kann paarweise in einem kleinen, dichten Terrarium gehalten werden.

Familie: Sphaerodactylidae Früherer Name: *Sphaerodactylus argus andresensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-20 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**20 × 20 × 20 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-28 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-60 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**6-10 Monate**
Gelegegröße	**1 Eier**
Inkubation	**100 Tage** bei 28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Sphaerodactylus argus* ist nur wenig bekannt, aber die Art ist leicht zu halten und zu züchten.
TEMPERATUR	Tagsüber sollen es 26-28 °C sein und nachts 20-22 °C. Im Winter darf die Tagestemperatur auf 24 °C und die Nachttemperatur auf 18 °C fallen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 50-60 % liegen, niedriger als für die meisten anderen Zwerggeckos, weil die Art an trockenen Orten lebt.
LICHT UND UVB	Der Gecko ist tagaktiv. Halte das Licht im Frühjahr und Sommer 12 Stunden täglich und im Winter 10 Stunden eingeschaltet.
FÜTTERUNG	Der Gecko ist Insektenfresser, und das gesamte Futter muss klein sein, höchstens so groß wie der Kopf des Tieres.
VERHALTEN UND UMGANG	Halte die Art einzeln oder als Paar. Zwei Männchen dürfen nicht zusammengesetzt werden, weil sie kämpfen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Jamaika und Kolumbien.