herpy

GECKOS

Carphodactylus laevis

Carphodactylus laevis ist ein schlanker, nachtaktiver Gecko aus den Regenwäldern im Nordosten von Queensland. Er hat lange, dünne Beine, Krallen an den Zehen, einen Kamm entlang des Rückens und einen karottenförmigen Schwanz und ist völlig anders gebaut als die meisten Geckos. Nachzuchttiere sind robust und vermehren sich bereitwillig, aber die Art ist in Menschenobhut weiterhin selten.

Familie: Carphodactylidae Englisch: Chameleon gecko Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**11-13 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**24-36 Monate**
Gelegegröße	**2 Eier**
Gelege pro Jahr	**4-6**
Inkubation	**90-133 Tage** bei 21-27 °C

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 35 × 70 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-28 °C**
Temperatur, Nacht	**16-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**75-100 %**
UVB	**Nicht nötig**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Carphodactylus laevis* braucht ein hohes Terrarium, das den Tieren Platz gibt, einander aus dem Weg zu gehen.
TEMPERATUR	*Carphodactylus laevis* stellt geringe Ansprüche an Wärme. Tagsüber sollte das Terrarium bei 22-28 °C liegen, und nachts fällt die Temperatur um 5-6 Grad auf etwa 16-22 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit ist für *Carphodactylus laevis* entscheidend und sollte ständig bei 75-100 % liegen.
LICHT UND UVB	*Carphodactylus laevis* ist nachtaktiv und lebt tagsüber versteckt, daher ist UVB nicht nötig. Tageslicht von einem Fenster in der Nähe reicht aus; sonst ein schwaches LED-Licht oder eine Leuchtstoffröhre.
FÜTTERUNG	*Carphodactylus laevis* ist nicht wählerisch, sobald sie sich an die Menschenobhut gewöhnt hat. Grillen können fast die gesamte Nahrung ausmachen, gern ergänzt durch Schaben. Füttere 2-3 Mal pro Woche.
VERHALTEN UND UMGANG	*Carphodactylus laevis* ist tagsüber ruhig und versteckt und wird wenige Minuten nach Einbruch der Dunkelheit aktiv. Sie setzt sich dann auf einen Ast oder ein Rindenstück und bleibt oft stundenlang sitzen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Australien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/carphodactylus-laevis