herpy

GECKOS

Cyrtodactylus irianjayaensis

Ein großer, kräftiger und nachtaktiver Bodengecko aus dem Regenwald im westlichen Teil Neuguineas, mit scharf gezeichneten Bändern und langen, scharfen Krallen. Die Art ist in Terrarien selten, braucht hohe Luftfeuchtigkeit und kühle Wärme und eignet sich am besten für Halter, die schon Geckos gehalten haben.

Familie: Gekkonidae Englisch: Giant bent-toed gecko Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-35 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 45 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**21-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**100-130 Tage** bei 24-27 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Ungenügende Datengrundlage (DD)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 90 × 45 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe).
TEMPERATUR	*Cyrtodactylus irianjayaensis* stammt aus kühlen tropischen Gebieten und ist kein Tier, das in der Wärme sitzt. Tagsüber sind 22-26 °C passend, und nachts darf die Temperatur auf 21-23 °C sinken.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art verlangt hohe Luftfeuchtigkeit, bis zu 100 % in den feuchtesten Phasen.
LICHT UND UVB	Die Art ist nachtaktiv und braucht kein starkes Licht. Normale, schwache Beleuchtung 12 Stunden am Tag ist reichlich, und ein schwaches Mondlicht kann verwendet werden, um das Tier nachts zu beobachten.
FÜTTERUNG	*C. irianjayaensis* ist ein gieriger Jäger und frisst große Beutetiere. Das Hauptfutter sind Insekten wie Schaben, große Heimchen und Heuschrecken. Gelegentlich kann zur Abwechslung eine neugeborene Maus gegeben werden.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist ruhig, wird aber leicht gestresst und sollte nicht angefasst werden. Sie hat lange, scharfe Krallen und kann richtig fest zubeißen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Indonesien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/cyrtodactylus-irianjayaensis