herpy

GECKOS

Cyrtodactylus peguensis

Ein nachtaktiver Gecko aus Myanmar, Thailand und Westmalaysia, bekannt aus den Wäldern bei Pegu. Es gibt nur wenige verlässliche Haltungsangaben zur Art, daher beruht die Anleitung auf Erfahrungen mit anderen Arten der Gattung und ist ein vorsichtiger Ausgangspunkt.

Familie: Gekkonidae Englisch: Pegu bent-toed gecko Früherer Name: *Gymnodactylus peguensis* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**8-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**23-27 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-90 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**90-150 Tage** bei 22-25 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Die Angaben hier sind von verwandten Arten der Gattung *Cyrtodactylus* und von den allgemeinen Anforderungen an nachtaktive, kletternde Geckos aus feuchten Gegenden übernommen, nicht von *C. peguensis* selbst.
TEMPERATUR	Es gibt keine dokumentierten Temperaturen für *Cyrtodactylus peguensis*.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Art ist vermutlich auf hohe Luftfeuchtigkeit angewiesen, aber die Werte sind von Verwandten übernommen. *C. irianjayaensis* wird bei 70-100 % gehalten und *C. elok* bei 70-85 %.
LICHT UND UVB	Es gibt kein dokumentiertes Wissen darüber, wie viel Licht *Cyrtodactylus peguensis* braucht. Die Art ist nachtaktiv, und verwandte Arten kommen mit schwacher Beleuchtung zurecht.
FÜTTERUNG	Die Art ist Insektenfresser. Die Angaben zum Futter sind von Verwandten übernommen und für *Cyrtodactylus peguensis* nicht dokumentiert.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Gattung hat den Ruf, scheu und schnell zu sein und eine dünne, empfindliche Haut zu haben, die leicht reißt. Wird sie ergriffen, kann sie beißen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Myanmar, Thailand und Malaysia.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/cyrtodactylus-peguensis