herpy

GECKOS

Ebenavia boettgeri

Ebenavia boettgeri ist ein kleiner, schlanker Gecko aus dem Tieflandregenwald an der Ostküste Madagaskars, einschließlich Schwanz etwa 6-8 cm lang. Er wurde viele Jahre als Teil von *Ebenavia inunguis* betrachtet und ist erst seit 2018 wieder eine eigenständige Art. Über die Haltung ist nur wenig bekannt.

Familie: Gekkonidae Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6-8 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**26-28 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**60-90 Tage** bei 24-27 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Über die Haltung von *Ebenavia boettgeri* ist nur wenig bekannt. Die Zahlen in dieser Anleitung sind von *Ebenavia inunguis* übernommen, der nächsten und am besten bekannten Verwandten, und passen zum Klima im Verbreitungsgebiet.

TEMPERATUR

Tagsüber soll das Terrarium auf 26-28 °C gehalten werden. Nachts sinkt die Temperatur im Sommer auf etwa 22 °C und im Winter auf 18 °C. Eine Leuchtstoffröhre liefert normalerweise genug Wärme.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll bei etwa 70 % liegen. Das ist leicht zu halten, indem das Terrarium einmal täglich besprüht wird, am besten abends, sodass Blätter und Rinde feucht werden.

LICHT UND UVB

Die Art ist nachtaktiv und versteckt sich tagsüber. Das Terrarium wird mit einer Leuchtstoffröhre beleuchtet und beheizt, im Sommer 12 Stunden und im Winter 10 Stunden täglich eingeschaltet, über eine Zeitschaltuhr gesteuert.

FÜTTERUNG

Gib kleine Insekten und andere kleine Gliedertiere, die kleiner als der Kopf des Tieres sind: Taufliegen, Springschwänze, frisch geschlüpfte und kleine Heimchen und kleine Asseln.

VERHALTEN UND UMGANG

Ebenavia boettgeri ist langsam und schleichend und nicht für das Handling geeignet. Tiere, die man aufzunehmen versucht, können flüchten und den Schwanz abwerfen, und er wächst nicht in derselben Form nach.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Madagaskar.