herpy

GECKOS

Gonatodes albogularis

Ein kleiner, tagaktiver Gecko aus Mittelamerika, Kolumbien, Venezuela und von den großen Karibikinseln. Das Männchen hat einen gelben bis orangegelben Kopf und einen dunklen Körper, während das Weibchen braun gefleckt ist. Die Art hat keine Haftlamellen, klettert und jagt aber bei Tageslicht und passt gut in ein dicht bepflanztes, hohes Terrarium.

Familie: Sphaerodactylidae Englisch: Yellow-headed gecko Früherer Name: *Gymnodactylus albogularis* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-10 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald und Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 30 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-28 °C**
Sonnenplatz	**28-30 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**10-12 Monate**
Gelegegröße	**1 Eier**
Inkubation	**60-100 Tage** bei 26-28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Die Art gedeiht in einem senkrechten Terrarium. Ein einzelner erwachsener Gecko kann in etwa 30 × 30 × 45 cm (Länge × Breite × Höhe) gehalten werden, und ein Paar braucht mindestens 40 × 30 × 45 cm.

TEMPERATUR

Gonatodes albogularis braucht tagsüber 24-28 °C. Ein kleiner wärmerer Bereich von 28-30 °C ist in Ordnung, aber die Art sonnt sich kaum, und es muss immer kühlere, schattige Plätze zum Zurückziehen geben.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 60-80 % liegen, und es muss gute Belüftung geben. Besprühe das Terrarium einmal am Tag, sodass Tropfen auf Blättern, Kork und Scheiben sitzen, von denen die Geckos trinken können.

LICHT UND UVB

Die Art ist tagaktiv und braucht 11-13 Stunden Licht pro Tag. Tageslichtröhren vom Typ T5 liefern sowohl Licht als auch ein wenig Wärme und reichen für sich allein aus.

FÜTTERUNG

Die Art ernährt sich von kleinen Insekten und anderer Beute, die kleiner ist als der Abstand zwischen den Augen des Tieres.

VERHALTEN UND UMGANG

Die Art ist scheuer als Taggeckos der Gattung *Phelsuma*, wird aber oft gesehen, besonders bei der Fütterung. Sie sollte nicht angefasst werden.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Venezuela, Kuba, Haiti, Jamaika und Kaimaninseln.