herpy

GECKOS

# *Gonatodes vittatus*

Ein kleiner, tagaktiver Gecko aus Venezuela, Kolumbien und von den vorgelagerten Inseln, dessen Männchen einen weißen Streifen mit schwarzem Rand auf dem Rücken und einen gelben Kopf trägt. Er klettert an Baumstämmen und Mauern, kann aber nicht an Glas hochlaufen, und er kommt in einem kleinen Terrarium gut zurecht, wenn er einzeln oder als Paar gehalten wird.

Familie: Sphaerodactylidae  Englisch: Wiegmann's striped gecko  Früherer Name: *Gymnodactylus vittatus; Gonatodes gillii*  Veröffentlicht am 16. November 2026

**STECKBRIEF**

## DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **7-8 cm**<br>Gesamtlänge inkl. Schwanz |
| Lebenserwartung | **10-20 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Baumbewohnend und bodenbewohnend** |
| Lebensraum | **Trockenwald** |
| Schwierigkeitsgrad | **Fortgeschritten** |

## HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **30 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H für 2 erwachsene Tiere |
| Temperatur, Tag | **24-27 °C** |
| Sonnenplatz | **29-32 °C** |
| Temperatur, Nacht | **20-24 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **50-60 %** |
| UVB | **Optional** |
| Ernährung | **Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)** |
| Haltung | **Einzeln oder paarweise** |

## ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Gelegegröße | **1 Eier** |
| Inkubation | **65-110 Tage**<br>bei 25-30 °C |

## SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Nicht gelistet** |
| EU-Anhang | **Nicht gelistet** |
| IUCN | **Nicht gefährdet (LC)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Ein Paar kann in einem Terrarium von 30 × 30 × 30 cm (Länge × Breite × Höhe) gehalten werden. Das ist ein Minimum, und ein größeres Terrarium ist besser, besonders wenn mehrere Tiere es sich teilen. |
| **TEMPERATUR** | Tagsüber sollen im Terrarium 24-27 °C herrschen. Ein warmer Platz von 29-32 °C kann mit einer Heizmatte oder einer Lampe geschaffen werden, ist aber nicht nötig, wenn die Temperatur sonst hoch und stabil ist. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER** | *Gonatodes vittatus* gedeiht in trockenerer Luft als die meisten tropischen Geckos. Halte die Luftfeuchtigkeit bei 50-60 %. |
| **LICHT UND UVB** | Die Art ist tagaktiv, aber ob sie UVB braucht, ist umstritten. UV-Licht steht im Verdacht, Probleme bei der Häutung zu verursachen, aber Tiere unter UV-Licht scheinen sich dafür leichter zu vermehren. |
| **FÜTTERUNG** | *Gonatodes vittatus* frisst Insekten und andere kleine Gliederfüßer. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | Die Art ist dreist und neugierig und wird tagsüber oft gesehen, aber sie ist kein Tier, das angefasst werden soll. Die Haut kann einreißen, wenn das Tier gegriffen wird, und die Tiere werden leicht gestresst. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Kolumbien, Venezuela, Guyana, Trinidad und Tobago, Aruba und Curaçao. |

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/gonatodes-vittatus