herpy

GECKOS

Asiatischer Hausgecko

Hemidactylus frenatus

Hemidactylus frenatus ist ein robuster, nachtaktiver Gecko aus Süd- und Südostasien, der mit Schiffen und Fracht in alle Tropen gelangt ist und heute in den Häusern weiter Teile der Welt lebt. Er klettert an senkrechten Flächen, jagt Insekten unter Lampen und ruft mit einem hohen, tickenden Glucksen. In Terrarien ist er selten, und am bekanntesten ist er als invasive Art.

Familie: Gekkonidae Englisch: Common house gecko Früherer Name: *Hemidactylus vittatus; Hemidactylus okinawensis* Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**8-15 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend und felsbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**30-32 °C**
Temperatur, Nacht	**22-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-70 %**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**6-12 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**46-62 Tage** bei 28-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht beurteilt (NE)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Hemidactylus frenatus* ist in Gefangenschaft selten beschrieben, daher sind die Empfehlungen hier eine Einschätzung auf Grundlage seiner Lebensweise und anderer kleiner, kletternder Geckos.
TEMPERATUR	Es gibt keine guten, öffentlich zugänglichen Temperaturwerte aus der Gefangenschaft, daher beruhen die Werte hier auf der Lebensweise der Art und darauf, dass sie ihre Körpertemperatur selbst bei 26-35 °C reguliert.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Halte eine Luftfeuchtigkeit von etwa 50-70 % und besprühe das Terrarium einmal täglich leicht, am besten abends, sodass Tau auf Blättern und Steinen liegt. Die Feuchtigkeit muss im Laufe des Tages sinken können.
LICHT UND UVB	*Hemidactylus frenatus* ist in der Dämmerung und nachts aktiv, und es gibt keine dokumentierte UVB-Empfehlung.
FÜTTERUNG	In der Natur ist *Hemidactylus frenatus* ein vielseitiger Jäger. Insekten und Spinnen machen den größten Teil der Nahrung aus: Schaben, Termiten, Fliegen, Motten, Käfer, Bienen und Wespen.
VERHALTEN UND UMGANG	*Hemidactylus frenatus* ist schnell, nervös und sollte nicht angefasst werden. Er kann beißen, wenn er gestresst ist, aber der Biss ist recht schwach und für Menschen harmlos.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Indien, Sri Lanka, Bangladesch, Myanmar, Thailand, Kambodscha, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapur, Indonesien und Philippinen.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/hemidactylus-frenatus