herpy

GECKOS

Homopholis fasciata

Ein kräftiger, samtweicher Gecko aus den Savannen Ostafrikas mit dunklen Bändern über dem Rücken und sowohl Haftlamellen als auch Krallen an den Zehen. Er ist vor allem nachts aktiv, versteckt sich in Löchern großer Bäume und stellt sich tot, wenn er bedroht wird. Die Haltung ist nur in groben Zügen beschrieben.

Familie: Gekkonidae Englisch: Banded velvet gecko Früherer Name: *Platypholis fasciata; Homopholis erlangeri* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**9-11 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**8-12 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-28 °C**
Sonnenplatz	**28-32 °C**
Temperatur, Nacht	**19-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
UVB	**Optional**
Winterruhe	**19-23 °C** 12-16 Wochen
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**2 Eier**
Gelege pro Jahr	**4-5**
Inkubation	**60-80 Tage** bei 26-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar kann in einem Terrarium von etwa 50 × 25 × 30 cm zurechtkommen, aber ein höheres Terrarium ist besser, weil *H. fasciata* klettert.
TEMPERATUR	Tagsüber soll die Temperatur bei 24-28 °C liegen, und es soll einen wärmeren Platz von 28-32 °C geben, z. B. unter einer kleinen Halogenlampe von 10-20 W oder über einer Heizmatte.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll mäßig bis hoch sein, 60-80 %, mit einem Gefälle von einem Ende des Terrariums zum anderen.
LICHT UND UVB	Die Art ist in der Dämmerung und nachts aktiv und kann bei Tageslicht gesehen werden, versteckt sich aber mittags im Schatten. Verwende normales Pflanzenlicht an einer Zeitschaltuhr, 12 Stunden an und 12 Stunden aus.
FÜTTERUNG	Das Hauptfutter sind Heimchen, ergänzt durch Schaben, Mehlwürmer und andere Insekten in passender Größe, damit das Futter abwechslungsreich ist. Wachsmottenlarven können ab und zu gegeben werden.
VERHALTEN UND UMGANG	*Homopholis fasciata* kann beißen und sich festhalten, und sie stellt sich tot und bleibt oft reglos liegen, wenn sie Angst hat, nimm sie daher nicht ohne Grund hoch. Gib neuen Tieren Zeit, sich einzugewöhnen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Äthiopien, Kenia, Somalia und Tansania.