herpy

GECKOS

Duvaucel-Gecko

Hoplodactylus duvaucelii

Hoplodactylus duvaucelii ist der größte lebende Gecko Neuseelands: schwer, olivgrau und nachtaktiv. Er kann über 40 Jahre alt werden, bringt ein oder zwei lebende Junge auf einmal zur Welt und wird erst mit etwa sieben Jahren geschlechtsreif. Heute lebt er nur noch auf raubtierfreien Inseln, und er ist eine Art für Spezialisten, nicht für die Hobbyhaltung.

Familie: Diplodactylidae Englisch: Duvaucel's gecko Früherer Name: *Platydactylus duvaucelii; Woodworthia duvaucelii; Naultinus duvauceli* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**25-32 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**45-120 g**
Lebenserwartung	**40-50 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend, felsbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Felsgelände und gemäßigter Wald und Wiese**
Schwierigkeitsgrad	**Experte**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 120 × 100 cm** L × B × H für 5 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**15-25 °C**
Sonnenplatz	**25-30 °C**
Temperatur, Nacht	**10-16 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-70 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten, Obst und Nektar**
Haltung	**Ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**72-84 Monate**
Wurfgröße	**1-2 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**150-240 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang III**
EU-Anhang	**Anhang C**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Es gibt keine gängige Hobbyhaltung von *Hoplodactylus duvaucelii*. Eine Gruppe von fünf erwachsenen Tieren braucht ein naturnah eingerichtetes Gehege von 1,44-1,5 m³, z.

TEMPERATUR

Die Art ist an ein gemäßigtes, ozeanisches Klima angepasst und das ganze Jahr über aktiv. Neuseeländische Echsen brauchen das ganze Jahr über eine Umgebungstemperatur von 5-25 °C, im Sommer etwa 15-25 °C und im Winter kühler.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Für neuseeländische Echsen sind 60-70 % Luftfeuchtigkeit ideal, solange die Tiere feuchtere Stellen aufsuchen können.

LICHT UND UVB

Die Tiere sind nachtaktiv, sonnen sich aber im Laufe des Tages verborgen.

FÜTTERUNG

Gib lebende Insekten oder Insektenlarven und ein Fruchtpüree mit Zusatz von Vitamin- und Mineralstoffpräparaten, im Sommer zweimal pro Woche und im Winter einmal pro Woche.

VERHALTEN UND UMGANG

Hoplodactylus duvaucelii ist ruhig und verträglich gegenüber Artgenossen und zeigt in Gefangenschaft keine Anzeichen von chronischem Stress.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Neuseeland.