herpy

GECKOS

Lygodactylus capensis

Lygodactylus capensis ist ein kleiner, graubrauner Zwergtaggecko aus dem südlichen und östlichen Afrika, der in Savanne und offenem Wald auf Bäumen und oft an Hauswänden lebt. Er ist tagaktiv, wird einschließlich Schwanz 7-9 cm lang und wiegt unter 1 g. Die Art ist die Typusart der Gattung und in der Natur häufig, wird aber selten gehalten.

Familie: Gekkonidae Englisch: Common dwarf gecko Früherer Name: *Hemidactylus capensis; Lygodactylus strigatus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-9 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**0,7-1,1 g**
Lebenserwartung	**4-6 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**30 × 30 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**30-35 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-75 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**9-15 Monate**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**60-120 Tage** bei 24-27 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Über die Pflege von *Lygodactylus capensis* ist nur wenig bekannt. Das Klima im Verbreitungsgebiet ist warm mit Regen im Sommer und einem trockenen, kühleren Winter, und die Art lebt auf Bäumen in Savanne und offenem Wald.

TEMPERATUR

Tagsüber soll die Grundtemperatur bei 25-30 °C liegen, mit einem Sonnenplatz von 30-35 °C unter einem kleinen Strahler.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit wird tagsüber bei 50-60 % und nachts bei 60-75 % gehalten. Besprühe das Terrarium jeden Morgen leicht, sodass Blätter und Wände Tropfen bekommen, und lass es im Laufe des Tages abtrocknen.

LICHT UND UVB

Lygodactylus capensis sitzt oft in voller Sonne und braucht kräftiges, gleichmäßiges Licht. Verwende T5-Leuchtstoffröhren oder LED mit Tageslicht und kombiniere sie mit einer UVB-Röhre.

FÜTTERUNG

Ameisen machen in der Natur 30-50 % der Nahrung aus. Im Terrarium besteht die Kost aus kleinen lebenden Futtertieren: kleinen Grillen, Fruchtfliegen, Springschwänzen, Bohnenkäfern, kleinen Asseln und kleinen Schaben.

VERHALTEN UND UMGANG

Lygodactylus capensis ist schnell und kann leicht entkommen oder verletzt werden, und der Schwanz wird leicht abgeworfen, daher eignet sich die Art nicht zum Handling. Öffne die Türen nur kurz und achte auf Spalten, durch die die Tiere entkommen können.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Südafrika, Eswatini, Mosambik, Simbabwe, Botsuana, Namibia, Angola, Sambia, Malawi, Kongo-Kinshasa, Tansania und Kenia.