herpy

GECKOS

Pristurus flavipunctatus

Ein kleiner, tagaktiver Gecko aus den Ländern rund um den südlichen Teil des Roten Meeres, mit hohem, sägezahnartig gekieltem Schwanz und gelben Flecken. Er wird einschließlich Schwanz etwa 8 cm lang, und über die Haltung ist fast nichts bekannt.

Familie: Sphaerodactylidae Englisch: Rüppell's semaphore gecko Früherer Name: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-8 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Felsbewohnend**
Lebensraum	**Halbwüste und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**28-30 °C**
Sonnenplatz	**40-45 °C**
Temperatur, Nacht	**20-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-40 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1 Eier**
Inkubation	**70-90 Tage** bei 28 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Über die Haltung von *Pristurus flavipunctatus* ist fast nichts bekannt. Die Haltungshinweise stützen sich auf das Klima im Verbreitungsgebiet und auf *Pristurus carteri*, die im Terrarium am besten bekannte Art der Gattung.

TEMPERATUR

Lege einen Gradienten mit 28-30 °C im kühlen Bereich und einem Sonnenplatz mit 40-45 °C unter einem Spotstrahler an. Nachts darf die Temperatur auf etwa 20-22 °C fallen.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luft soll trocken sein, etwa 30-40 %.

LICHT UND UVB

P. flavipunctatus ist tagaktiv und braucht kräftiges Tageslicht und UVB über dem Sonnenplatz, z. B. eine T5-Röhre. Ferguson-Zone 3 ist eine Schätzung für einen tagaktiven Wüstengecko; die Zone ist für die Art nicht gemessen.

FÜTTERUNG

Die Art frisst kleine Gliedertiere. Biete Springschwänze, Taufliegen, kleine Grillen und andere kleine Insekten an, nicht breiter als der Kopf des Tieres.

VERHALTEN UND UMGANG

Pristurus flavipunctatus ist schnell und wachsam, eignet sich nicht zum Handling, und der Schwanz kann abbrechen. Das Verhalten der Tiere untereinander in Menschenobhut ist nicht dokumentiert.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Eritrea, Äthiopien, Dschibuti, Somalia, Sudan, Südsudan, Ägypten und Saudi-Arabien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/pristurus-flavipunctatus