herpy

GECKOS

Rhacodactylus trachycephalus

Rhacodactylus trachycephalus ist ein seltener, nachtaktiver Kletterer von der Île des Pins und der kleinen Insel Môrô in Neukaledonien und bringt lebende Junge zur Welt. Die Art ist in der Natur vom Aussterben bedroht und in Menschenobhut selten. Die Haltung ähnelt den übrigen *Rhacodactylus*-Arten, aber die Tiere sind teuer, wachsen langsam und bekommen höchstens zwei Junge pro Jahr.

Familie: Diplodactylidae Englisch: Lesser rough-snouted gecko Früherer Name: *Chameleonurus trachycephalus; Rhacodactylus trachyrhynchus trachycephalus* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**10-14 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**15-20 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**65-70 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten und Fertigfutter**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**36-60 Monate**
Wurfgröße	**1-2 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1**
Tragzeit	**180 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Vom Aussterben bedroht (CR)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Die Art gedeiht am besten in einem hohen Terrarium von mindestens 45 × 45 × 90 cm (Länge × Breite × Höhe). Es bietet Platz für ein bis vier Tiere, und ein größeres Terrarium ist immer ein Vorteil.

TEMPERATUR

Für *Rhacodactylus trachycephalus* sind in der Natur keine genauen Temperaturen gemessen worden, daher beruhen die Zahlen auf Erfahrungen mit der Art in Menschenobhut und mit verwandten *Rhacodactylus*-Arten.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit sollte bei etwa 65-70 % liegen. Sie kann mit einer lebenden Pflanze, feuchtem Sphagnum in einem Versteck und regelmäßigem Besprühen gehalten werden.

LICHT UND UVB

Die Art ist völlig nachtaktiv und kommt erst hervor, wenn es dunkel ist. Es ist nicht nachgewiesen, dass UVB notwendig ist.

FÜTTERUNG

Das Futter besteht aus lebenden Insekten und einem trockenen Pollen- und Nektarfutter für Taggeckos, das die ganze Zeit zur Verfügung steht. Gib vier ausgewachsene Grillen pro erwachsenes Tier einmal pro Woche.

VERHALTEN UND UMGANG

Die Art ist ruhig, und bei regelmäßigem Handling werden die Tiere zahm und genauso leicht aufzunehmen wie *Correlophus ciliatus*. Die Tiere sind nachts aktiv, handhabe sie daher abends.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Neukaledonien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/gekkoer/rhacodactylus-trachycephalus