herpy

CHAMÄLEONS

Brookesia superciliaris

Brookesia superciliaris ist eines der größten Blattchamäleons und wird insgesamt 9-10 cm lang. Es lebt in der Laubschicht der östlichen Regenwälder Madagaskars, ist braun wie ein totes Blatt und hat große Knochenhöcker über den Augen. Die Art wird in einem kleinen, feuchten Terrarium mit tiefer Laubschicht und kleinen Futtertieren gehalten. Sie hat den Ruf, schwierig zu sein, wird heute aber regelmäßig in kleinen Stückzahlen nachgezüchtet.

Familie: Chamaeleonidae Englisch: Brown Leaf Chameleon Früherer Name: *Chamaeleo superciliaris* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**9-10 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**2-4 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**20-25 °C**
Temperatur, Nacht	**16-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-95 %**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**4-5 Monate**
Gelegegröße	**2-5 Eier**
Gelege pro Jahr	**2-3**
Inkubation	**45-120 Tage** bei 18-27 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Brookesia superciliaris* gibt es nur wenig zusammenhängendes Wissen.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur muss 20-25 °C und die Nachttemperatur 16-20 °C betragen, wie im Regenwald des Hochlands. Der Abfall in der Nacht ergibt sich von selbst, wenn die Lampen ausgeschaltet werden.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit muss bei 70-95 % liegen, am höchsten direkt nach dem Sprühen und nachts. Sprühe das Terrarium mindestens morgens und abends gründlich mit lauwarmem Wasser.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und lebt im Schatten.
FÜTTERUNG	Die Art frisst kleine Insekten: Fruchtfliegen, Springschwänze, kleine Grillen, Bohnenkäfer und kleine Schaben. Die Beute darf höchstens etwa 20 % der Körperlänge des Tieres betragen.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art wird einzeln gehalten. Sie ist scheu, aber lebhaft und wird durch Störung und Berührung leicht gestresst, daher sollte sie nicht in die Hand genommen werden. Bei Gefahr kann sie vibrieren.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Madagaskar.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/kamaeleoner/brookesia-superciliaris