herpy

CHAMÄLEONS

Teppichchamäleon

Furcifer lateralis

Furcifer lateralis ist ein kleines, farbenprächtiges Chamäleon aus den Wäldern, dem Gestrüpp und den Gärten Madagaskars. Das Weibchen ist besonders stark gezeichnet, vor allem wenn es trächtig ist. Die Art wird nur 17-25 cm lang, reift in wenigen Monaten und lebt nur 2-3 Jahre, und ihre bescheidene Größe macht sie für den geübten Halter zu einem überschaubaren Chamäleon.

Familie: Chamaeleonidae Englisch: Carpet Chameleon Früherer Name: *Chamaeleo lateralis; Chamaeleo lambertoni* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**17-25 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**2-3 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Savanne und Regenwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Sonnenplatz	**32-35 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-100 %**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**3-6 Monate**
Gelegegröße	**6-23 Eier**
Gelege pro Jahr	**3-6**
Inkubation	**150-400 Tage** bei 20-25 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 45 × 45 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe).
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur soll 24-29 °C betragen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll 60-100 % betragen. Das Terrarium darf im Laufe des Tages gern abtrocknen, solange die Luft relativ feucht ist und das Tier täglich trinken kann.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und sonnenliebend und braucht daher kräftiges Licht und UVB. Verwende eine T5-HO-Röhre mit 6500 K für das Licht und eine UVB-Röhre, die am Sonnenplatz Ferguson-Zone 3 ergibt.
FÜTTERUNG	*F. lateralis* ist reiner Insektenfresser. Die Beute soll etwa so lang sein wie der Abstand zwischen den Augen; Mehlwürmer dürfen länger sein.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art wird einzeln gehalten. Die Männchen sind aggressiv und territorial, und die Weibchen stressen leicht.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Madagaskar.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/kamaeleoner/furcifer-lateralis