herpy

CHAMÄLEONS

Trioceros hoehnelii

Trioceros hoehnelii ist ein kleines, lebendgebärendes Chamäleon aus den kühlen Hochländern Kenias und Ugandas, wo die Nächte sich dem Gefrierpunkt nähern können. Das Männchen hat einen hohen Helm und ein Horn auf der Schnauze. Die Art ist robust gegen Kälte, verträgt aber Wärme schlecht, daher braucht sie ein kühles Terrarium mit einem deutlichen Temperaturabfall in der Nacht und hoher Nachtfeuchtigkeit.

Familie: Chamaeleonidae Englisch: Von Hoehnel's Chameleon Früherer Name: *Chamaeleo hoehnelii; Chamaeleo bergeri; Chamaeleo leikipiensis* Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**18-25 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Gewicht	**15-70 g**
Lebenserwartung	**5-6 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**20-22 °C**
Sonnenplatz	**24-25 °C**
Temperatur, Nacht	**8-14 °C**
Luftfeuchtigkeit	**50-100 %**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Lebendgebärend**
Geschlechtsreif	**12 Monate**
Wurfgröße	**4-22 Jungtiere**
Gelege pro Jahr	**1-2**
Tragzeit	**120-180 Tage**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein adultes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 60 × 45 × 90 cm (Länge × Breite × Höhe). Das Maß ist von ähnlichen kleinen Bergchamäleons der Gattung *Trioceros* übernommen und ein Minimum.
TEMPERATUR	Die Art stammt aus kühlem Hochland und verträgt Wärme schlecht. Die Tagestemperatur im Terrarium muss 20-22 °C betragen, und der Sonnenplatz darf nicht wärmer sein als 24-25 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Nacht ist die feuchte Zeit der Art. Die Luftfeuchtigkeit muss nachts gegen 100 % steigen, mit Nebel aus einem Ultraschallvernebler etwa drei Stunden spät in der Nacht und früh am Morgen.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und nutzt viel Licht. Gib das ganze Jahr 12 Stunden Licht am Tag. Eine T5-HO-Röhre mit 6500 K oder eine kräftige LED-Lampe über der Breite des Terrariums gibt das normale Licht. UVB ist nötig.
FÜTTERUNG	*T. hoehnelii* ist Insektenfresser und nimmt die meisten Insekten passender Größe.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art wird einzeln gehalten. Die Männchen sind gegeneinander und gegenüber ähnlichen Arten sehr aggressiv: Sie fauchen, blasen sich auf und werden schwarz, daher dürfen sich Männchen nicht sehen können.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kenia und Uganda.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/kamaeleoner/trioceros-hoehnelii