herpy

LEGUANE

## Rotkehlanolis

# *Anolis carolinensis*

*Anolis carolinensis* ist eine schlanke, kletternde Echse aus dem Südosten der USA, die je nach Temperatur, Licht und Stimmung zwischen Grün und Braun wechselt. Sie wird 12-20 cm lang einschließlich Schwanz, ist tagaktiv und ernährt sich von kleinen Insekten. Sie braucht ein hohes, helles und feuchtes Terrarium mit UVB und einem warmen Sonnenplatz; das Männchen wird allein oder mit ein paar Weibchen gehalten.

Familie: Dactyloidae  Englisch: Green Anole  Früherer Name: *Ameiua bullaris; Anolis baccatus; Anolis podargicus; Anolius carolinensis; Norops baccatus*

**STECKBRIEF**

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **12-20 cm**<br>Gesamtlänge inkl. Schwanz |
| Gewicht | **2-6 g** |
| Lebenserwartung | **4-8 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Baumbewohnend** |
| Lebensraum | **Gemäßigter Wald und Wiese** |
| Schwierigkeitsgrad | **Fortgeschritten** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **60 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H für 1 erwachsenes Tier |
| Temperatur, Tag | **22-28 °C** |
| Sonnenplatz | **30-35 °C** |
| Temperatur, Nacht | **18-24 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **60-70 %** |
| Wasser | **Wasserschale** |
| UVB | **Notwendig**<br>Ferguson-Zone 2 |
| Ernährung | **Insekten** |
| Haltung | **Einzeln oder ein Männchen mit mehreren Weibchen** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Geschlechtsreif | **4-12 Monate** |
| Gelegegröße | **1-2 Eier** |
| Gelege pro Jahr | **6-10** |
| Inkubation | **35-49 Tage**<br>bei 28-30 °C |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Nicht gelistet** |
| EU-Anhang | **Nicht gelistet** |
| IUCN | **Nicht gefährdet (LC)** |

## Haltung auf einen Blick

**DAS TERRARIUM**
Ein einzelner Anolis braucht ein Terrarium von mindestens 60 × 60 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe). Größer ist besser, besonders in der Höhe, denn die Art klettert und nutzt den ganzen Raum.

**TEMPERATUR**
Der Sonnenplatz muss 30-35 °C haben, gemessen am Ast direkt unter dem Wärmestrahler. Der Rest des Terrariums wird tagsüber auf 22-28 °C gehalten, und nachts sind 18-24 °C passend.

**LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER**
Die Luftfeuchtigkeit muss im Durchschnitt 60-70 % betragen, mittags niedriger und nachts höher. Besprühe die Pflanzen morgens und abends, damit das Tier die Tropfen von den Blättern trinken kann.

**LICHT UND UVB**
Die Art ist tagaktiv und braucht jeden Tag kräftiges Licht und UVB. Sie sonnt sich im Halbschatten, und die UVB-Lampe muss Ferguson-Zone 2 liefern, d. h. einen UV-Index von höchstens etwa 3 am Sonnenplatz.

**FÜTTERUNG**
*Anolis carolinensis* ist Insektenfresser und nimmt lebende, bewegliche Beute.

**VERHALTEN UND UMGANG**
Die Männchen sind territorial und zeigen sich, indem sie mit dem Kopf nicken, den Kehlfächer ausklappen und sich aufblasen. Zwei Männchen im selben Terrarium kämpfen, und das schwächere nimmt Schaden oder erliegt dem Stress.

**NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET**
Vereinigte Staaten.