herpy

LEGUANE

Streifenbasilisk

Basiliscus vittatus

Basiliscus vittatus ist eine schnelle, langbeinige Echse von Gewässerufern in Mexiko und Mittelamerika, bekannt dafür, auf zwei Beinen über das Wasser zu laufen. Das Männchen wird einschließlich Schwanz bis zu 60 cm lang und trägt einen großen Kopfkamm. Die Art ist tagaktiv, ernährt sich überwiegend von Insekten und braucht ein hohes, feuchtes Terrarium mit UVB, einem warmen Sonnenplatz und einem Wasserteil.

Familie: Corytophanidae Englisch: Brown Basilisk Früherer Name: *Cristasaurus mitrella; Dactylocalotes elisa*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**35-60 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend, bodenbewohnend und semiaquatisch**
Lebensraum	**Trockenwald, Regenwald und Feuchtgebiet**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**90 × 90 × 120 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-30 °C**
Sonnenplatz	**35-40 °C**
Temperatur, Nacht	**23-26 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserteil**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten, Obst und Wirbeltiere**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder ein Männchen mit mehreren Weibchen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**6-15 Monate**
Gelegegröße	**2-18 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-5**
Inkubation	**55-70 Tage** bei 28-31 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar oder ein Männchen mit zwei Weibchen braucht ein hohes Terrarium von mindestens 90 × 90 × 120 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist besser.
TEMPERATUR	Die Luft muss tagsüber 25-30 °C haben, und der Sonnenplatz muss eine Oberflächentemperatur von 35-40 °C haben, gemessen mit einem Infrarotthermometer. Nachts sind 23-26 °C passend.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit muss 60-80 % betragen. Besprühe das Terrarium und das Laub 1-2 Mal täglich oder verwende eine zeitgesteuerte Nebel- oder Beregnungsanlage, und miss mit einem Hygrometer.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Das Tier badet und verbringt Zeit im Wasser, und der Wasserteil muss groß genug sein, dass das ganze Tier darin liegen kann. Ein gefilterter Wasserbehälter oder ein Wasserfall hält das Wasser sauber und erhöht die Feuchtigkeit.
LICHT UND UVB	*Basiliscus vittatus* ist tagaktiv und braucht den ganzen Tag UVB, um D3 zu bilden und Kalk aufzunehmen.
FÜTTERUNG	*Basiliscus vittatus* ernährt sich überwiegend von Insekten und anderen Gliederfüßern, nimmt aber auch heruntergefallene Beeren, und ältere Tiere fressen mehr pflanzliche Kost.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist scheu, schnell und reagiert auf Handling mit Stress. Tiere, die man aufnimmt, flüchten oder beißen. Wird ein Tier aufgenommen, muss das ruhig und nur bei Bedarf geschehen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Mexiko, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama.