herpy

LEGUANE

## Nashornleguan

# *Cyclura cornuta*

*Cyclura cornuta* ist ein schwerer, kräftiger Felsenleguan aus den trockenen Regionen Hispaniolas in der Karibik. Er trägt hornartige Knoten auf der Schnauze, wird 60-136 cm lang und wiegt 4,5-9 kg. Die Art ist in der Natur bedroht. Nachzuchten sind in der Regel ruhig, doch die Art braucht einen eigenen kleinen Raum, kräftige Wärme und UVB, pflanzliche Kost und eine Pflege über 20 Jahre oder mehr.

Familie: Iguanidae  Englisch: Rhinoceros Iguana  Früherer Name: *Aloponotus cornutus; Iguana cornuta; Lacerta cornuta; Metopoceros cornutus*

**STECKBRIEF**

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **60-136 cm**<br>Gesamtlänge inkl. Schwanz |
| Gewicht | **4.500-9.000 g** |
| Lebenserwartung | **15-25 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Felsbewohnend, bodenbewohnend und grabend** |
| Lebensraum | **Halbwüste, Trockenwald und Felsgelände** |
| Schwierigkeitsgrad | **Erfahren** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **400 × 250 × 200 cm**<br>L × B × H für 2 erwachsene Tiere |
| Temperatur, Tag | **27-33 °C** |
| Sonnenplatz | **36-42 °C** |
| Temperatur, Nacht | **20-24 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **40-60 %** |
| Wasser | **Wasserschale** |
| UVB | **Notwendig**<br>Ferguson-Zone 3 |
| Ernährung | **Obst und Pflanzen** |
| Haltung | **Einzeln oder paarweise** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Geschlechtsreif | **24-108 Monate** |
| Gelegegröße | **5-24 Eier** |
| Gelege pro Jahr | **1** |
| Inkubation | **85-92 Tage**<br>bei 30 °C |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Anhang I** |
| EU-Anhang | **Anhang A** |
| IUCN | **Stark gefährdet (EN)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Platz ist für die Pflege von *Cyclura cornuta* entscheidend; zu wenig Platz und zu wenig Sonnenlicht sind die Hauptgründe dafür, dass die Tiere in Gefangenschaft nicht gedeihen. |
| **TEMPERATUR** | Die Lufttemperatur soll tagsüber 27-33 °C betragen, und die Höhlen dürfen gern etwas kühler sein. Der Sonnenplatz soll an der Oberfläche 36-42 °C haben. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER** | Die Art stammt aus einem trockenen Klima, und die Luftfeuchtigkeit im Terrarium soll mäßig sein, etwa 40-60 %. Die Werte sind für die Art nicht belegt, sondern aus dem Klima des Lebensraums abgeleitet. |
| **LICHT UND UVB** | *Cyclura cornuta* ist tagaktiv und braucht Wärme, kräftiges Tageslicht und UVB. |
| **FÜTTERUNG** | Die Art ist fast ein reiner Pflanzenfresser. Die Grundlage ist Blattgrün: Löwenzahn und Kohlblätter wie Rübenblätter und Blattsenf, ergänzt mit Endivie, Chicorée und Brunnenkresse. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | Nachzuchten sind meist ruhig und tolerant, und manche suchen Aufmerksamkeit. Die Stimmung kann schwanken, und ein sonst freundliches Tier kann Phasen haben, in denen es in Ruhe gelassen werden will. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Haiti und Dominikanische Republik. |