herpy

LEGUANE

Texas-Krötenechse

Phrynosoma cornutum

Phrynosoma cornutum ist eine breite, abgeflachte Echse mit Hörnern am Kopf und zwei Reihen spitzer Schuppen an den Seiten. Sie lebt auf offenem, trockenem Grasland und in Gebüsch im Süden der USA und im Norden Mexikos. Sie wird von der Schnauze bis zur Kloake 7-13 cm lang, ist tagaktiv und lebt überwiegend von Ameisen. Gerade die Nahrung ist das große Hindernis: Sie ist schwer zu ersetzen, und die Art gehört zu den am schwierigsten zu haltenden Echsen im Terrarium.

Familie: Phrynosomatidae Englisch: Texas horned lizard Früherer Name: *Agama cornuta; Phrynosoma brevicornis; Phrynosoma bufonium; Phrynosoma harlanii; Phrynosoma planiceps*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**7-13 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Gewicht	**25-90 g**
Lebenserwartung	**7-9 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Halbwüste und Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Experte**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**27-29 °C**
Sonnenplatz	**38-42 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**20-40 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**24 Monate**
Gelegegröße	**14-37 Eier**
Gelege pro Jahr	**1**
Inkubation	**40-61 Tage** bei 27-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Phrynosoma cornutum* ist nur wenig bekannt. Die Pflege beruht daher auf dem Lebensraum: offenes, trockenes Gelände, lockerer Boden, starke Sonne und eine Nahrung aus Ameisen.
TEMPERATUR	Die Art ist ein Sonnenanbeter und braucht einen Sonnenplatz, dessen Oberfläche 38-42 °C erreicht, gemessen mit einem Infrarotthermometer.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit soll niedrig sein, 20-40 %, und das Terrarium soll im Laufe des Tages völlig abtrocknen. Der Boden darf nicht nass sein.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv und verbringt den Tag in offenem Sonnenlicht, daher braucht sie das ganze Jahr über kräftiges Licht und UVB.
FÜTTERUNG	Die Nahrung ist die entscheidende Einschränkung. In der Natur bestehen etwa 70 % der Nahrung aus Ernteameisen (*Pogonomyrmex*), und die Jungtiere fressen nur kleine Ameisen. Der Rest sind Termiten, Käfer und Heuschrecken.
VERHALTEN UND UMGANG	*Phrynosoma cornutum* ist ruhig und still und lebt allein. Sie macht nicht viel Aufhebens und ist leicht zu übersehen, weil sie mit dem Untergrund verschmilzt.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Vereinigte Staaten und Mexiko.