herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Brazil-nut Poison Frog

Adelphobates castaneoticus

Adelphobates castaneoticus ist ein kleiner, glänzend schwarzer Pfeilgiftfrosch mit weißen oder gelblichen Flecken und leuchtend orangen Flecken an Vorderbeinen und Knien. Er lebt am Waldboden im brasilianischen Bundesstaat Pará im Amazonasgebiet und ist nach der Paranuss benannt, deren leere Schalen das Männchen als Wasserbecken für die Kaulquappen nutzt. Über die Haltung ist nur wenig bekannt.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Dendrobates castaneoticus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**18-23 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**8-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**5-7 Monate**
Eier pro Gelege	**4-8**
Schlupf	**10-14 Tage**
Larvenzeit	**60-90 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und andere Kaulquappen**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-27 °C**
Temperatur, Nacht	**20-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Adelphobates castaneoticus* ist nur wenig bekannt. Die Art lebt in der Laubschicht des Waldbodens in einem warmen, feuchten Tieflandklima.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur muss 24-27 °C betragen, und nachts fällt sie um 3-4 °C auf 20-24 °C. Die Schwankung über das Jahr muss gering sein, 1-2 °C. Das passt zum Tieflandklima in Pará.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss mittags etwa 70-80 % betragen und morgens und abends nahe 100 %, und Laubschicht und Bodengrund müssen ständig feucht sein.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine Wasserschale ist nicht nötig, solange man keine Nachzucht will. Die Frösche bekommen ihre Feuchtigkeit vom Sprühen und vom feuchten Laub.
LICHT UND UVB	Gib täglich 10-12 Stunden Licht mit Leuchtstoffröhren oder LED für die Pflanzen. In der Natur lebt die Art im Schatten unter den Baumkronen, das Licht soll also den Pflanzen genug zum Wachsen geben, ohne das Terrarium aufzuheizen.
FÜTTERUNG	*A. castaneoticus* ernährt sich in der Natur von Ameisen, Termiten und anderen kleinen Gliederfüßern. In menschlicher Obhut werden Springschwänze, kleine Fruchtfliegen und kleine Asseln gefüttert.
VERHALTEN UND UMGANG	*A. castaneoticus* ist tagaktiv und lebt überwiegend am Waldboden. Temperament und Territorialverhalten sind nicht dokumentiert, aber *A. galactonotus* kann gegenüber Artgenossen aggressiv werden, wenn sie geschlechtsreif wird.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Brasilien.