herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Sanguine Poison Frog

Allobates zaparo

Allobates zaparo ist ein kleiner, tagaktiver Frosch von etwa 3 cm aus dem Regenwald am Andenfuß in Ecuador und im Norden Perus. Adulte Tiere haben einen roten Rücken, schwarze Flanken, einen blauen Bauch und gelbe Flecken an den Beinen und ahmen die giftigen *Ameerega bilinguis* und *Ameerega parvula* nach, sind selbst aber ungiftig. Die Art wird nur selten gehalten, daher beruht die Haltung auf dem Klima und auf der Verwandten *Allobates femoralis*.

Familie: Aromobatidae Früherer Name: *Epipedobates zaparo; Phyllobates zaparo; Dendrobates zaparo*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-27 °C**
Temperatur, Nacht	**21-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**8-20**
Schlupf	**15-20 Tage**
Larvenzeit	**40-50 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Allobates zaparo* ist nur wenig bekannt. Die Art wird nur selten gehalten, und Nachzucht in menschlicher Obhut ist nicht beschrieben.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium tagsüber bei 24-27 °C und nachts bei 21-23 °C. Die Werte entsprechen dem Klima im Tiefland Ecuadors am Fuß der Anden. Die Schwankung im Jahresverlauf soll gering sein, 1-2 °C. Eine Winterruhe gibt es nicht.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss mittags 70-80 % betragen und morgens und abends nahe 100 %.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Biete eine flache Glasschale mit 1-2 cm Wasser an, aus der die Frösche leicht herauskommen. Die Schale wird von den Adulten genutzt, wenn die Kaulquappen abgesetzt werden.
LICHT UND UVB	Das Licht dient in erster Linie den Pflanzen: 10-12 Stunden täglich mit LED-Licht mit pflanzengeeignetem Spektrum. Es ist nicht dokumentiert, dass *Allobates zaparo* UVB braucht.
FÜTTERUNG	In der Natur sind Ameisen ein wichtiger Teil der Nahrung.
VERHALTEN UND UMGANG	*Allobates zaparo* ist tagaktiv und lebt in der Laubschicht. Die Männchen rufen von der Oberseite des Laubs, um Weibchen anzulocken.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Ecuador und Peru.