herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Cainarachi Poison Frog

Ameerega cainarachi

Ameerega cainarachi ist ein rotrückiger Pfeilgiftfrosch von etwa 3 cm, der nur vom Fuß der Berge um Tarapoto im Norden Perus bekannt ist. Die Art ist in der Natur gefährdet, und über die Haltung ist nur wenig bekannt, daher beruht die Anleitung auf Klima, Lebensraum und den nahen Verwandten *Ameerega bassleri* und *Ameerega pepperi*.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**19-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**12-13 Monate**
Eier pro Gelege	**22-44**
Schlupf	**10 Tage**
Larvenzeit	**50-60 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Ameerega cainarachi* ist nur wenig bekannt. Die Art lebt im selben Gebiet wie *Ameerega bassleri* und *Ameerega pepperi*, und die Zuchtwerte sind von ihnen übernommen (siehe Zucht).
TEMPERATUR	Tagsüber passen 22-26 °C, und nachts muss die Temperatur um bis zu 5 °C auf etwa 19-22 °C fallen. Der Unterschied zwischen den Jahreszeiten beträgt nur 1-2 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss 70-100 % betragen: etwa 70 % mittags und nahe 100 % mit Nebel morgens und abends. Besprühe oder verwende Beregnungsanlage und Vernebler ein paar Mal täglich.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine flache Wasserschale mit 1-2 cm Wasser genügt, und sie muss leicht zu betreten und zu verlassen sein.
LICHT UND UVB	Das Licht muss vor allem den Bedarf der Pflanzen decken: LED-Licht für Pflanzenwachstum 10-12 Stunden am Tag mit einer deutlichen Nacht.
FÜTTERUNG	Die Frösche nehmen die üblichen kleinen Futtertiere: Fruchtfliegen (*Drosophila melanogaster* und *Drosophila hydei*), Springschwänze, kleine Asseln, frisch geschlüpfte Heimchen, die kleinsten Wachsmadenlarven und gekäscherte Kleininsekten von der Wiese.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ameerega cainarachi* ist tagaktiv und hält sich am Waldboden auf. Die Männchen der Gattung sind territorial und rufen von festen Plätzen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Peru.