herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Yurimaguas Poison Frog

Ameerega hahneli

Ameerega hahneli ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 17-22 mm mit hellen Seitenstreifen und blauem Bauch, der in der Laubstreu des Regenwalds in weiten Teilen des Amazonas-Tieflands lebt. Das Männchen trägt die Kaulquappen zu fließendem Wasser, und die Kaulquappen brauchen Strömung im Wasser. Die Art ist in der Natur häufig, in Gefangenschaft aber selten.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Epipedobates hahneli; Dendrobates hahneli*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**17-22 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**6-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**7-12 Monate**
Eier pro Gelege	**6-33**
Schlupf	**4-16 Tage**
Larvenzeit	**55-65 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**23-25 °C**
Temperatur, Nacht	**19-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**65-90 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Ameerega hahneli* ist nur begrenztes Wissen vorhanden, und die Ansprüche können zwischen den verschiedenen Formen und möglichen verborgenen Arten variieren.
TEMPERATUR	*Ameerega hahneli* braucht tagsüber 23-25 °C und nachts 19-21 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit muss 65-90 % betragen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Es muss immer etwas Wasser erreichbar sein, zum Beispiel in der Drainagerinne oder in einer flachen Wasserschale mit 1-2 cm Wasser. In der Trockenzeit wird die Rinne nicht geleert, damit die Tiere weiterhin Zugang zu Wasser haben.
LICHT UND UVB	Als Licht können Leuchtstoffröhren oder LEDs mit pflanzengeeignetem Spektrum 10-12 Stunden verwendet werden.
FÜTTERUNG	Die kleine Fruchtfliege (*Drosophila melanogaster*) ist das wichtigste Futter. Erwachsene Tiere nehmen auch die große Fruchtfliege (*Drosophila hydei*), lassen sie aber oft aus, weil sie etwas zu groß ist.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist tagaktiv und lebt am Boden, ist aber am frühen Morgen sowie am späten Nachmittag und Abend am aktivsten; den Rest des Tages ist sie scheuer.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Brasilien, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Guyana, Französisch-Guayana und Suriname.