herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Three-striped Poison Frog

Ameerega trivittata

Ameerega trivittata ist ein großer, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 4-6 cm vom Waldboden Amazoniens. Er ist schwarz mit zwei hellgrünen Streifen entlang der Flanken, und das Männchen trägt auf einmal oft 15-30 Kaulquappen auf dem Rücken zum Wasser. Der Frosch braucht ein geräumigeres Terrarium als die kleinen Pfeilgiftfrösche.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Epipedobates trivittatus; Dendrobates trivittatus; Phobobates trivittatus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**4-6 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**12-24 Monate**
Eier pro Gelege	**15-40**
Schlupf	**15-22 Tage**
Larvenzeit	**40-90 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**70 × 50 × 50 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**23-25 °C**
Temperatur, Nacht	**19-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Terrarium von mindestens 70 × 50 × 50 cm (Länge, Breite, Höhe) passt für zwei erwachsene *Ameerega trivittata*.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur wird bei 23-25 °C gehalten, und nachts wird sie um 3-4 °C auf etwa 19-22 °C abgesenkt. Die Schwankung über das Jahr sollte gering sein, 1-2 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte die meiste Zeit des Tages bei 80-90 % liegen, morgens und abends nahe 100 %, und mittags darf sie auf etwa 70 % fallen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine flache Wasserschale mit 1-2 cm Wasser genügt. Die Schale muss so flach sein, dass ein Jungtier hinausklettern kann, mit Steinen oder Moos am Rand.
LICHT UND UVB	UVB ist für Pfeilgiftfrösche im Allgemeinen nicht als notwendig dokumentiert, und für genau diese Art gibt es keine Angaben. Ein schwaches UVB-Licht (Ferguson-Zone 1) ist optional.
FÜTTERUNG	Die Nahrung besteht aus kleinen lebenden Gliederfüßern.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Männchen rufen laut und verteidigen kleine Reviere, während die Weibchen ruhig sind. Es ist nicht dokumentiert, wie sich die Art in Gefangenschaft in Gruppen verhält, daher ist ein Paar die sicherste Haltungsform.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Guyana, Peru, Suriname und Venezuela.