herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Andean Poison Frog

Andinobates opisthomelas

Andinobates opisthomelas ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 15-20 mm aus den kolumbianischen Anden, wo er in der Laubschicht im feuchten Bergwald in Antioquia und Caldas lebt. Die Art ist in der Natur gefährdet, und über die Pflege ist fast nichts bekannt.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Ranitomeya opisthomelas; Dendrobates opisthomelas; Minyobates opisthomelas*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-20 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**1-2**
Schlupf	**16-24 Tage**
Larvenzeit	**108-112 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 50 × 60 cm** L × B × H für 5 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-25 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Andinobates opisthomelas* ist fast nichts bekannt, und die Art wird kaum gehalten. Die Pflege beruht auf dem Lebensraum, dem kühlen und feuchten Bergwald mit Laubschicht und Bromelien, und auf nahen Verwandten.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur soll bei 22-25 °C liegen, und nachts darf sie wie im Bergwald auf 18-21 °C fallen. Halte die Temperatur unter 27 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 80-100 % liegen und nie unter 70 %.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine Wasserschale ist nicht nötig; die Frösche trinken Tropfen von Pflanzen und Sprühwasser. Für die Kaulquappen werden Bromelien mit Wasser in den Blattachseln oder kleine Plastikbecher mit 2-3 cm Wasser verwendet.
LICHT UND UVB	Das Licht ist vor allem für die Pflanzen da: Pflanzenlicht für 10-12 Stunden am Tag sorgt für Tagesrhythmus und Wachstum.
FÜTTERUNG	Das Futter besteht aus kleinen Gliederfüßern: Springschwänzen, kleinen Fruchtfliegen (*Drosophila melanogaster*) und kleinen Asseln. Frisch verwandelte Jungtiere nehmen nur Springschwänze.
VERHALTEN UND UMGANG	*Andinobates opisthomelas* ist tagaktiv und lebt am Boden, sie hält sich also tief im Terrarium auf, in der Laubschicht und an den Bromelien.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kolumbien.