herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Andinobates tolimensis

Andinobates tolimensis ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 17-19 mm mit braunem Rücken und metallisch glänzendem gelb-bronzefarbenem Kopf. Er ist nur aus einem kleinen Stück Nebelwald im nördlichen Tolima in Kolumbien bekannt, wurde erst 2007 beschrieben und wird kaum gehalten. Die Pflege beruht daher auf dem kühlen, feuchten Bergklima des Lebensraums.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Ranitomeya tolimense; Ranitomeya tolimensis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**17-19 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**19-23 °C**
Temperatur, Nacht	**15-19 °C**
Luftfeuchtigkeit	**85-100 %**
Wasser	**Keine Wasserschale**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**1-2**
Schlupf	**16-24 Tage**
Larvenzeit	**108-152 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Andinobates tolimensis* ist nur wenig bekannt, und die Art wird kaum in Gefangenschaft gehalten.
TEMPERATUR	Halte 19-23 °C am Tag und 15-19 °C in der Nacht, was zu Nebelwald in etwa 1.800 m Höhe passt. Frösche aus kühlem Bergwald vertragen Wärme schlecht, daher muss das Terrarium kühl stehen, ohne Sonne vom Fenster und ohne Wärmelampen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit soll das ganze Jahr über bei 85-100 % liegen, und die Laubschicht muss ständig feucht sein.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Die Art braucht keinen Wasserteil. Das Wasser befindet sich in den Blatttrichtern der Bromelien, in denen die Kaulquappen aufwachsen, und es muss regelmäßig gewechselt werden, damit es nicht trüb wird.
LICHT UND UVB	*A. tolimensis* lebt in dichtem Wald mit wenig Licht am Boden, daher ist das Licht vor allem für die Pflanzen da. Gib 10-12 Stunden Licht am Tag mit LED oder Leuchtstoffröhren und Dunkelheit in der Nacht.
FÜTTERUNG	Das Futter besteht aus kleinen Gliederfüßern: den kleinsten Springschwänzen und Fruchtfliegen (*Drosophila*) und kleinen Rollasseln. Füttere 3-4 Mal pro Woche und lass immer lebende Futtertiere im Terrarium.
VERHALTEN UND UMGANG	Das Verhalten in Gefangenschaft ist nicht dokumentiert. Der Frosch lebt am schattigen Waldboden und versteckt sich in Löchern zwischen den Wurzeln, im Laub und im Moos. Das Männchen ruft vom Boden aus.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kolumbien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/pfeilgiftfroesche/andinobates-tolimensis