herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Anthony's Poison Arrow Frog

Epipedobates anthonyi

Epipedobates anthonyi ist ein kleiner, roter und gestreifter Pfeilgiftfrosch von 19-27 mm aus dem Südwesten Ecuadors und dem Nordwesten Perus. Es ist der Frosch, der jahrzehntelang als „tricolor“ verkauft wurde, und er ist wohl der am häufigsten gehaltene und nachgezüchtete Pfeilgiftfrosch überhaupt: robust, dreist, ruffreudig und ein eifriger Züchter.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Dendrobates anthonyi; Phyllobates anthonyi*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**19-27 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-14 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**5-10 Monate**
Eier pro Gelege	**10-40**
Schlupf	**9-14 Tage** bei 22-24 °C
Larvenzeit	**43-89 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Potenziell gefährdet (NT)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Terrarium von mindestens 40 × 40 × 40 cm eignet sich für ein Männchen und zwei Weibchen von *Epipedobates anthonyi*. Eine Gruppe von 5-10 Tieren braucht mindestens 60 × 60 × 40 cm, und mehr Tiere brauchen mehr Bodenfläche.
TEMPERATUR	Halte am Tag 22-26 °C mit sowohl kühleren als auch wärmeren Zonen, und lasse die Temperatur nachts auf Zimmertemperatur fallen, etwa 18-21 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 80-100 % liegen. Die Art verträgt kurzzeitig bis zu 50 %, wenn sie Zugang zu Wasser hat, doch niedrige Luftfeuchtigkeit ohne Wasser kann schnell tödlich werden.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Lege ein oder mehrere kleine Wasserstellen mit etwa 2 cm Wasser an, z. B. Untersetzer, Trinkschalen oder halbe Paranussschalen, aus denen die Frösche leicht herauskommen.
LICHT UND UVB	Das Licht ist für die Pflanzen. Leuchtstoffröhren oder LED-Leisten für etwa 12 Stunden am Tag genügen, und die Tageslänge darf im Jahresverlauf gern etwas variieren.
FÜTTERUNG	*Epipedobates anthonyi* ist klein, aber gefräßig und nimmt verhältnismäßig große Beutetiere.
VERHALTEN UND UMGANG	*Epipedobates anthonyi* ist tagaktiv, dreist und oft zu sehen, und die Männchen rufen mit einem Triller, am meisten morgens und nach dem Sprühen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Ecuador und Peru.