herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Darwin Wallace poison frog

Epipedobates darwinwallacei

Epipedobates darwinwallacei ist ein kleiner, schwarzer Pfeilgiftfrosch von 13-20 mm mit orangefarbenen bis gelben Flecken. Er lebt im Bergwald um Mindo im Nordwesten Ecuadors und ist gefährdet. Seit 2024 gilt er als Synonym von *Epipedobates espinosai*. Über die Haltung ist nur wenig bekannt.

Familie: Dendrobatidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**13-20 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**8-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-24 °C**
Temperatur, Nacht	**18-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 2-5 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**10-30**
Schlupf	**9-14 Tage**
Larvenzeit	**42-70 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Epipedobates darwinwallacei* ist nur wenig bekannt, und die Art wird kaum gehalten.
TEMPERATUR	Halte tagsüber 20-24 °C und nachts 18-20 °C. Das entspricht dem kühlen Ende dessen, was für *Epipedobates tricolor* aus derselben Höhe passt. Das schafft man normalerweise mit Raumtemperatur und der Beleuchtung.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit soll 80-100 % betragen. Besprühe mehrmals täglich oder verwende eine Regenanlage, z. B. dreimal täglich 20-60 Sekunden, gern ergänzt durch einen Vernebler.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Biete einen kleinen, festen Wasserteil mit 2-5 cm Wasser und einer sanften Schräge oder Rampe, damit die Frösche leicht hinaufkommen.
LICHT UND UVB	Das Licht ist für die Pflanzen: Leuchtstoffröhren oder LED-Leisten etwa 12 Stunden am Tag. Die nahe verwandten Arten gedeihen ohne UVB, es ist also optional.
FÜTTERUNG	Die Frösche bekommen lebende, kleine Beutetiere: Springschwänze und Taufliegen (*Drosophila melanogaster*), und erwachsene Tiere nehmen zusätzlich die größere *Drosophila hydei* und frisch geschlüpfte Heimchen.
VERHALTEN UND UMGANG	*E. darwinwallacei* ist tagaktiv und bewegt sich offen zwischen Gras und Laub. Der Ruf ähnelt sehr dem Ruf der braunen *E. espinosai* aus dem Tiefland. Die Männchen der Gattung sind territorial und rufen von festen Plätzen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Ecuador.