herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Phantasmal poison frog

Epipedobates tricolor

Epipedobates tricolor ist ein kleiner, dunkelbrauner Pfeilgiftfrosch von 19-23 mm mit gelben bis gelbgrünen Streifen und Flecken. Er lebt nur an den Westhängen der Anden in Zentralecuador und ist bedroht. Fast alle „tricolor“ im Handel sind in Wirklichkeit die nah verwandte *Epipedobates anthonyi*; echte *E. tricolor* sind in den Terrarien selten.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Dendrobates tricolor; Phyllobates tricolor*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**19-23 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-14 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**5-10 Monate**
Eier pro Gelege	**10-20**
Schlupf	**9-14 Tage** bei 22-24 °C
Larvenzeit	**42-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Männchen und zwei Weibchen von *Epipedobates tricolor* brauchen ein Terrarium von mindestens 40 × 40 × 40 cm. Eine Gruppe von 5-10 Tieren braucht mindestens 60 × 60 × 40 cm, und mehr Tiere benötigen mehr Grundfläche.
TEMPERATUR	Halte tagsüber 22-26 °C mit kühleren und wärmeren Zonen und lass die Temperatur nachts auf 18-20 °C fallen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 80-100 % liegen. Die Art verträgt kurzzeitig bis zu 50 %, wenn sie Zugang zu Wasser hat, doch niedrige Luftfeuchtigkeit ohne Wasser kann schnell tödlich werden.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Lege ein oder mehrere kleine Wasserstellen mit etwa 2 cm Wasser an, z. B. Untersetzer, Trinkschalen oder halbe Paranussschalen, aus denen die Frösche leicht herauskommen. Das Männchen kann sie nutzen, um Kaulquappen abzusetzen.
LICHT UND UVB	Das Licht ist für die Pflanzen da. Leuchtstoffröhren oder LED-Leisten für etwa 12 Stunden am Tag genügen, und die Tageslänge kann gern im Jahresverlauf etwas variieren.
FÜTTERUNG	*Epipedobates tricolor* ist klein, aber gefräßig und nimmt verhältnismäßig große Beutetiere.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Männchen von *Epipedobates tricolor* rufen mit einer leisen, trillernden Stimme, meist morgens und besonders nach dem Sprühen, am häufigsten von einem erhöhten Sitzplatz.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Ecuador.