herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Trinidad Poison Frog

Mannophryne trinitatis

Mannophryne trinitatis ist ein kleiner, brauner und tagaktiver Frosch von 25-28 mm, der nur auf Trinidad vorkommt, wo er an klaren, steinigen Bächen im feuchten Wald lebt. Das Männchen kann kohlschwarz werden, wenn es ruft, und das Weibchen hat eine leuchtend gelbe Kehle. Die Art wird kaum gehalten, und über die Pflege ist nur wenig bekannt.

Familie: Aromobatidae Früherer Name: *Phyllobates trinitatis*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**25-28 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 45 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**23-27 °C**
Temperatur, Nacht	**20-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 3-5 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Eier pro Gelege	**6-13**
Schlupf	**21 Tage**
Larvenzeit	**40-50 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Mannophryne trinitatis* ist nur wenig bekannt.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur soll 23-27 °C und die Nacht 20-22 °C betragen. Frösche aus Waldbächen vertragen Hitze schlecht, daher halte die Temperatur unter 28 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit soll 80-100 % betragen. Besprühe täglich, sodass Blätter und Steine nass sind. Eine Nebelanlage erleichtert es, die Feuchtigkeit stabil zu halten. Sorge für Belüftung, damit die Luft nicht stehend wird.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Die Art braucht einen festen Wasserteil mit flachem, sauberem und gern leicht fließendem Wasser, 3-5 cm tief, mit Steinen und Blättern.
LICHT UND UVB	UVB ist kaum nötig, aber eine niedrige Dosis (Ferguson-Zone 1) ist optional. Pflanzenlicht über 10-12 Stunden hält Moos und Farne am Leben.
FÜTTERUNG	Die Art braucht kleine Gliederfüßer: kleine und große Fruchtfliegen (*Drosophila melanogaster* und *Drosophila hydei*), Springschwänze und kleine Asseln.
VERHALTEN UND UMGANG	*Mannophryne trinitatis* ist tagaktiv und territorial. Die Weibchen verteidigen ihre Plätze häufiger als die Männchen, mit Drohen, Ringen und Jagen, und sie zeigen die gelbe Kehle als Drohung.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Trinidad und Tobago.