herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Granular Poison Frog

Oophaga granulifera

Oophaga granulifera ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 19-22 mm von der Pazifikseite Costa Ricas und dem äußersten Westen Panamas. Die Haut ist deutlich gekörnt, der Rücken rot, orange oder olivgrün, und Beine und Bauch sind blaugrün bis türkis. Die Art lebt entlang beschatteter Waldbäche, und das Weibchen füttert seine Kaulquappen mit unbefruchteten Eiern.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Dendrobates granuliferus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**19-22 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**6 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**12-18 Monate**
Eier pro Gelege	**2-5**
Schlupf	**19-20 Tage**
Larvenzeit	**87-212 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Unbefruchtete Eier des Weibchens**
Brutpflege	**Bewacht das Gelege, trägt die Kaulquappen und füttert die Kaulquappen mit Eiern**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-25 °C**
Temperatur, Nacht	**17-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Gefährdet (VU)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Haltung von *Oophaga granulifera* gibt es nur wenig Wissen, und die Art ist in der Hobbyhaltung selten.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur sollte bei 21-25 °C liegen, und die Frösche sind bei 20-22 °C am aktivsten. Nachts soll die Temperatur um 4-5 °C fallen, auf etwa 17-21 °C. Die jahreszeitliche Schwankung ist minimal, etwa 1-2 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 80-90 % liegen und 100 % früh am Morgen und spät am Tag betragen, wenn das Terrarium besprüht wird.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine flache Wasserschale von 1-2 cm Tiefe, zum Beispiel eine flache Schale, die im Boden eingegraben ist, oder ein Wasserteil zwischen den Steinen, liefert Trinkwasser und Luftfeuchtigkeit.
LICHT UND UVB	Die Art lebt am schattigen Waldboden, daher muss das Licht zuerst den Bedarf der Pflanzen decken.
FÜTTERUNG	Erwachsene Tiere bekommen kleine, flugunfähige Bananenfliegen, Springschwänze, frisch geschlüpfte Mikrogrillen, die kleinsten Wachsmottenlarven und Wiesenplankton.
VERHALTEN UND UMGANG	*Oophaga granulifera* ist scheu und lebt sehr versteckt, besonders in der Trockenzeit, in der sie sich fast ganz abschottet.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Costa Rica und Panama.