herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

## Golfodulcean Poison Frog

# *Phyllobates vittatus*

*Phyllobates vittatus* ist ein schwarzer Pfeilgiftfrosch mit zwei kräftigen orangefarbenen oder gelben Streifen entlang des Rückens und blau marmorierten Beinen. Er lebt nur im Tieflandwald rund um den Golfo Dulce im Südwesten von Costa Rica. Im Terrarium ist er tagaktiv, ruffreudig und ein eifriger Züchter, und das Männchen trägt die Kaulquappen selbst zum Wasser.

Familie: Dendrobatidae

STECKBRIEF

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **3-4 cm**<br>Kopf-Rumpf-Länge |
| Lebenserwartung | **10-20 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Bodenbewohnend** |
| Lebensraum | **Regenwald** |
| Hautgift in der Natur | **Schwach** |
| Hautgift in Menschenobhut | **Keins**<br>Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten |
| Schwierigkeitsgrad | **Fortgeschritten** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Entwicklung | **Kaulquappen werden zum Wasser getragen** |
| Eiablage | **Am Boden** |
| Geschlechtsreif | **8-10 Monate** |
| Eier pro Gelege | **7-21** |
| Larvenzeit | **45-80 Tage**<br>vom Schlupf bis zur Metamorphose |
| Larvenfutter | **Fertigfutter** |
| Brutpflege | **Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **60 × 45 × 45 cm**<br>L × B × H für 4 erwachsene Tiere |
| Temperatur, Tag | **21-25 °C** |
| Temperatur, Nacht | **18-21 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **70-100 %** |
| Wasser | **Wasserschale**<br>Tiefe 1-2 cm |
| UVB | **Optional**<br>Ferguson-Zone 1 |
| Ernährung | **Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)** |
| Haltung | **Paarweise oder in Gruppen** |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Anhang II** |
| IUCN | **Gefährdet (VU)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Bis zu vier Tiere von *Phyllobates vittatus* brauchen ein Terrarium von mindestens 60 × 45 × 45 cm. Eine Gruppe von 5-6 Tieren braucht mehr Platz, z. |
| **TEMPERATUR** | Tagsüber braucht *Phyllobates vittatus* 21-25 °C und nachts 18-21 °C, was die meisten Wohnräume leisten. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN** | Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 70-100 % liegen. Die Art verträgt kurzzeitig bis zu 50 %, wenn sie Zugang zu Wasser hat, doch niedrige Luftfeuchtigkeit ohne Wasser kann schnell tödlich werden. |
| **WASSER UND WASSERQUALITÄT** | Biete eine flache Wasserschale oder einen kleinen Wasserteil mit 1-2 cm Wasser und einem Stein oder Rindenstück, damit die Tiere leicht hinaufkommen. |
| **LICHT UND UVB** | Das Licht ist für die Pflanzen da. LED-Leisten oder Leuchtstoffröhren an einer Zeitschaltuhr für 10-12 Stunden am Tag genügen, und die Nacht soll dunkel sein. Sorge für Schatten und stelle das Terrarium niemals in direkte Sonne. |
| **FÜTTERUNG** | *Phyllobates vittatus* ist ungewöhnlich, weil erwachsene Tiere größere Beute nehmen als die meisten Pfeilgiftfrösche. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | *Phyllobates vittatus* ist tagaktiv, und die Männchen haben einen hohen, trillernden Ruf. Die Art kann paarweise oder in Gruppen gehalten werden. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Costa Rica. |