herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya amazonica

Ranitomeya amazonica ist ein winziger, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 16-19 mm aus dem Amazonasgebiet um Iquitos in Peru und Leticia in Kolumbien. Er ist schwarz mit roten, orangen oder gelben Streifen und blaugrauer Marmorierung an den Beinen, züchtet in Bromelien und gilt als eine der am leichtesten zu haltenden und nachzuzüchtenden kleinen *Ranitomeya*.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Dendrobates amazonicus*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**16-19 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**In Blattachseln (z. B. Bromelien)**
Geschlechtsreif	**5-8 Monate**
Eier pro Gelege	**2-8**
Schlupf	**10-14 Tage**
Larvenzeit	**60-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter und andere Kaulquappen**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**21-26 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar oder Trio *Ranitomeya amazonica* braucht ein Terrarium von mindestens 40 × 40 × 40 cm.
TEMPERATUR	Halte das Terrarium tagsüber bei 21-26 °C und nachts bei 18-21 °C. Die Frösche sind am aktivsten und züchten am besten am warmen Ende, bei 24-26 °C.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte 70-100 % betragen, am besten 80-100 %. Sprühe jeden Tag, gern morgens und abends, sodass die Feuchtigkeit nach dem Sprühen nahe 100 % liegt und mittags auf etwa 70-75 % fällt.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	*Ranitomeya amazonica* schwimmt schlecht, daher muss das Wasser niedrig und leicht zu verlassen sein.
LICHT UND UVB	Die Frösche sind tagaktiv und leben im Schatten des Waldes. Das Licht ist vor allem für die Pflanzen da: Gib 12-14 Stunden LED-Pflanzenlicht am Tag. *Ranitomeya amazonica* hat keinen bekannten UVB-Bedarf, daher ist UVB optional.
FÜTTERUNG	*Ranitomeya amazonica* ist so klein, dass sie nur kleine Futtertiere nehmen kann.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ranitomeya amazonica* ist tagaktiv, aber oft scheu, und besonders Jungtiere verstecken sich viel. In einem dicht bepflanzten Terrarium mit vielen welken Blättern kommen die Frösche mehr hervor.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Peru und Kolumbien.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/pfeilgiftfroesche/ranitomeya-amazonica