herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

Brazilian Poison Frog

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von 17-19 mm aus dem westlichen Amazonasgebiet. Er lebt in den Bäumen und zieht seinen Nachwuchs in Wasser auf, das sich in Bromelien sammelt. Das Weibchen füttert die Kaulquappen mit unbefruchteten Eiern.

Familie: Dendrobatidae Früherer Name: *Dendrobates vanzolinii*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**17-19 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-6 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**23-26 °C**
Temperatur, Nacht	**19-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 1-2 cm
UVB	**Optional**
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen werden zum Wasser getragen**
Eiablage	**In Blattachseln (z. B. Bromelien)**
Eier pro Gelege	**1-6**
Schlupf	**10-14 Tage**
Larvenzeit	**60-80 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter und unbefruchtete Eier des Weibchens**
Brutpflege	**Trägt die Kaulquappen und füttert die Kaulquappen mit Eiern**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar *Ranitomeya vanzolinii* braucht ein Terrarium von mindestens 40 × 40 × 40 cm, gern 50 × 50 × 50 cm.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur soll bei 23-26 °C liegen, und nachts wird sie um 3-4 °C auf 19-23 °C gesenkt. Die Schwankung über das Jahr soll gering sein, 1-2 °C. Ein Wärmeplatz ist nicht nötig, und die Art hält keine Winterruhe.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte 70-100 % betragen. Morgens und abends sollte sie nahe bei 100 % liegen, mittags darf sie auf 70-75 % fallen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Eine Wasserschale ist für die erwachsenen Tiere nicht nötig, aber von Vorteil, und sie kann flach sein, mit 1-2 cm Wasser.
LICHT UND UVB	Der Lichtbedarf von *Ranitomeya vanzolinii* ist bescheiden. Der Frosch braucht gerade genug Licht, um sein Futter zu sehen, und die Pflanzen brauchen mehr.
FÜTTERUNG	*Ranitomeya vanzolinii* lebt von kleinen, lebenden Gliederfüßern: Fruchtfliegen, Springschwänzen, kleinen tropischen Asseln und frisch geschlüpften Heimchen. Kleine Tiere brauchen kleine Futtertiere.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ranitomeya vanzolinii* ist tagaktiv, aber scheu. In einem dicht bepflanzten Terrarium mit vielen Verstecken zeigt sie sich häufiger als in einem spärlich eingerichteten.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Brasilien und Peru.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/pfeilgiftfroesche/ranitomeya-vanzolinii