herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

## Amazonian Poison Frog

# *Ranitomeya ventrimaculata*

*Ranitomeya ventrimaculata* ist ein kleiner, tagaktiver Pfeilgiftfrosch von unter 18 mm aus dem Regenwald im östlichen Ecuador, im nordöstlichen Peru und im südöstlichen Kolumbien. Im engen Sinn ist er schwarz mit dünnen rosa Streifen und blaugrauem Netzmuster auf Beinen und Bauch. Der Name hat in der Hobbyhaltung jahrzehntelang andere Arten bezeichnet, daher ist es wichtig zu wissen, was die Tiere tatsächlich sind.

Familie: Dendrobatidae  Früherer Name: *Dendrobates ventrimaculatus; Dendrobates minutus ventrimaculatus; Dendrobates duellmani; Ranitomeya duellmani*

STECKBRIEF

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **15-17 mm**<br>Kopf-Rumpf-Länge |
| Lebenserwartung | **5-10 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Baumbewohnend und bodenbewohnend** |
| Lebensraum | **Regenwald** |
| Hautgift in der Natur | **Schwach** |
| Hautgift in Menschenobhut | **Keins**<br>Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten |
| Schwierigkeitsgrad | **Erfahren** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Entwicklung | **Kaulquappen werden zum Wasser getragen** |
| Eiablage | **Am Boden** |
| Eier pro Gelege | **1-4** |
| Larvenzeit | **60-80 Tage**<br>vom Schlupf bis zur Metamorphose |
| Larvenfutter | **Fertigfutter und andere Kaulquappen** |
| Brutpflege | **Trägt die Kaulquappen** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **40 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H für 2 erwachsene Tiere |
| Temperatur, Tag | **21-26 °C** |
| Temperatur, Nacht | **18-22 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **70-100 %** |
| Wasser | **Wasserschale**<br>Tiefe 1-2 cm |
| UVB | **Optional** |
| Ernährung | **Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)** |
| Haltung | **Paarweise oder in Gruppen** |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Anhang II** |
| IUCN | **Nicht gefährdet (LC)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Die Art im engeren Sinn ist in Terrarien fast unbekannt, und es gibt keine Haltungserfahrungen, die genau für sie gelten. Die Zahlen hier sind dieselben wie für die anderen kleinen Ranitomeya. |
| **TEMPERATUR** | Halte das Terrarium tagsüber bei 21-26 °C und nachts bei 18-22 °C. Die Temperatur darf nie über 29 °C steigen, und kleine Terrarien werden im Sommer schnell zu warm. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN** | Die Luftfeuchtigkeit sollte 70-100 % betragen: nahe 100 % morgens und abends und 70-75 % mittags. |
| **WASSER UND WASSERQUALITÄT** | Biete den Fröschen eine flache Wasserschale oder einen kleinen Wasserteil mit 1-2 cm Wasser, sodass der kleinste Frosch mit Kopf und Oberkörper über Wasser sitzen kann; die kleinen Pfeilgiftfrösche schwimmen schlecht. |
| **LICHT UND UVB** | Die Frösche sind tagaktiv und leben im Schatten des Waldes. Das Licht ist vor allem für die Pflanzen da: 12-14 Stunden am Tag mit LED-Licht sind üblich. |
| **FÜTTERUNG** | *Ranitomeya ventrimaculata* ist so klein, dass sie nur kleine Futtertiere nehmen kann: Springschwänze, flugunfähige Fruchtfliegen (*Drosophila melanogaster*), kleine tropische Asseln und frisch geschlüpfte Heimchen. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | *Ranitomeya ventrimaculata* ist tagaktiv und lebt meist im Laub am Waldboden. Die Männchen rufen mit einem schnellen Summen. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Ecuador, Peru und Kolumbien. |

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/pfeilgiftfroesche/ranitomeya-ventrimaculata