herpy

PFEILGIFTFRÖSCHE

# *Ameerega cainarachi*

*Ameerega cainarachi* ist ein rotrückiger Pfeilgiftfrosch von etwa 3 cm, der nur vom Fuß der Berge um Tarapoto im Norden Perus bekannt ist. Die Art ist in der Natur gefährdet, und über die Haltung ist nur wenig bekannt, daher beruht die Anleitung auf Klima, Lebensraum und den nahen Verwandten *Ameerega bassleri* und *Ameerega pepperi*.

Familie: Dendrobatidae  Englisch: Cainarachi Poison Frog  Früherer Name: *Epipedobates cainarachi; Epipedobates ardens*  Veröffentlicht am 16. November 2026

## STECKBRIEF

### DAS TIER

| | |
|---|---|
| Größe (adult) | **3 cm**<br>Kopf-Rumpf-Länge |
| Lebenserwartung | **10-15 Jahre** |
| Aktiv | **Tagsüber** |
| Lebensweise | **Bodenbewohnend** |
| Lebensraum | **Regenwald** |
| Hautgift in der Natur | **Schwach** |
| Hautgift in Menschenobhut | **Keins**<br>Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten |
| Schwierigkeitsgrad | **Fortgeschritten** |

### ZUCHT

| | |
|---|---|
| Fortpflanzung | **Eierlegend** |
| Entwicklung | **Kaulquappen werden zum Wasser getragen** |
| Eiablage | **Am Boden** |
| Geschlechtsreif | **12-13 Monate** |
| Eier pro Gelege | **22-44** |
| Schlupf | **10 Tage** |
| Larvenzeit | **50-60 Tage**<br>vom Schlupf bis zur Metamorphose |
| Larvenfutter | **Algen/Pflanzen und Fertigfutter** |
| Brutpflege | **Bewacht das Gelege und trägt die Kaulquappen** |

### HALTUNG

| | |
|---|---|
| Mindestgröße Terrarium | **40 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H für 2 erwachsene Tiere |
| Temperatur, Tag | **22-26 °C** |
| Temperatur, Nacht | **19-22 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **70-100 %** |
| Wasser | **Wasserschale**<br>Tiefe 1-2 cm |
| UVB | **Optional**<br>Ferguson-Zone 1 |
| Ernährung | **Insekten und kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)** |
| Haltung | **Paarweise** |

### SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

| | |
|---|---|
| CITES | **Anhang II** |
| IUCN | **Stark gefährdet (EN)** |

## Haltung auf einen Blick

| | |
|---|---|
| **DAS TERRARIUM** | Über die Haltung von *Ameerega cainarachi* ist nur wenig bekannt. Die Art lebt im selben Gebiet wie *Ameerega bassleri* und *Ameerega pepperi*, und die Zuchtwerte sind von ihnen übernommen (siehe Zucht). |
| **TEMPERATUR** | Tagsüber passen 22-26 °C, und nachts muss die Temperatur um bis zu 5 °C auf etwa 19-22 °C fallen. Der Unterschied zwischen den Jahreszeiten beträgt nur 1-2 °C. |
| **LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN** | Die Luftfeuchtigkeit muss 70-100 % betragen: etwa 70 % mittags und nahe 100 % mit Nebel morgens und abends. Besprühe oder verwende Beregnungsanlage und Vernebler ein paar Mal täglich. |
| **WASSER UND WASSERQUALITÄT** | Eine flache Wasserschale mit 1-2 cm Wasser genügt, und sie muss leicht zu betreten und zu verlassen sein. |
| **LICHT UND UVB** | Das Licht muss vor allem den Bedarf der Pflanzen decken: LED-Licht für Pflanzenwachstum 10-12 Stunden am Tag mit einer deutlichen Nacht. |
| **FÜTTERUNG** | Die Frösche nehmen die üblichen kleinen Futtertiere: Fruchtfliegen (*Drosophila melanogaster* und *Drosophila hydei*), Springschwänze, kleine Asseln, frisch geschlüpfte Heimchen, die kleinsten Wachsmadenlarven und gekäscherte Kleininsekten von der Wiese. |
| **VERHALTEN UND UMGANG** | *Ameerega cainarachi* ist tagaktiv und hält sich am Waldboden auf. Die Männchen der Gattung sind territorial und rufen von festen Plätzen. |
| **NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET** | Peru. |